

Loradina

Spefar

Loratadina 10 mg

Comprimidos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su médico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar al médico.

Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada comprimido de Loratadina contiene Loratadina 10 mg, excipientes: c.s.

Contiene lactosa.

¿Qué es Loradina y para qué se utiliza?

Loratadina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos. **Loratadina** ayuda a reducir sus síntomas de alergia, bloqueando los efectos de una sustancia llamada "histamina", que se produce en el organismo cuando se es alérgico a algo.

Loratadina está indicada para el tratamiento sintomático de cuadros alérgicos como rinitis alérgica (estornudos, goteo o picor nasal) y escozor o picor en los ojos), conjuntivitis aguda, rinoфарингитis, laringotraqueobronquitis, alergia a alimentos; en adultos y niños mayores de 6 años, que pesen más de 30 kg. También se puede utilizar para ayudar a aliviar los síntomas de la urticaria (tales como picazón, enrojecimiento y el número y el tamaño de las ronchas cutáneas), rinitis perenne, dermatitis y eczema de contacto.

No tome este medicamento si:

Es alérgico (hipersensible) a la **Loratadina** o a alguno de los demás componentes.

Tenga precaución:

Antes de iniciar el tratamiento con **Loratadina**, informe a su médico si:

- Presenta una enfermedad de hígado.

- Se le va a efectuar cualquier tipo de prueba cutánea para la alergia. No tome **Loratadina** durante los 2 días previos a la realización de dichas pruebas, porque este medicamento puede alterar los resultados de las mismas.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda su uso si está embarazada o en período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, no se espera que **Loratadina** produzca somnolencia o disminución del estado de alerta. Sin embargo, en muy raras ocasiones algunas personas experimentan somnolencia, que puede afectar a su capacidad de conducir o utilizar máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de Loradina

Loratadina contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud. Los efectos secundarios de **Loratadina** pueden aumentar cuando se utiliza junto con medicamentos que alteran el rendimiento de algunas enzimas que se encuentran en el hígado (CYP3A4 y CYP2D6 del citocromo P450) como Cimetidina, Eritromicina, Ketoconazol, Quimidina, Fluconazol, y Fluoxetina; o si su hígado no está funcionando bien.

Toma de Loradina con los alimentos y bebidas

Loratadina puede tomarse con o sin alimentos. No se ha demostrado que **Loratadina** aumente los efectos de las bebidas alcohólicas.

3563-23/04/19

3563

3563 Loradina

Spefar

FORMATO

104x139

SOPORTE

Mayor a 60 g/m²

ACTUALIZACIÓN

23/04/19

APROBACIÓN

23/04/19

PLEGADO

104 mm en 3

1 Tinta Pantone / 654 C

654 C



hM Digital

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Loradina** puede producir efectos no deseados. Los efectos adversos comunicados más frecuentes incluyen: somnolencia, dolor de cabeza, aumento del apetito, dificultad para dormir, nerviosismo, cansancio. Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes): reacción alérgica grave (incluyendo hinchazón), mareo, convulsiones, latidos cardíacos irregulares o rápidos, náuseas (ganas de vomitar), sequedad de boca, malestar de estómago, problemas de hígado, pérdida del cabello, erupción cutánea, cansancio. Frecuencia no conocida: Aumento de peso. No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

Cómo tomar Loradina

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Loradina** indicadas por su médico.

Adultos y niños mayores de 12 años:

Tome 1 comprimido 1 vez al día con un vaso de agua, con o sin alimentos. Se recomienda tomar en la mañana, preferiblemente en ayunas.

Uso en niños

Niños de 6 a 12 años de edad con peso corporal mayor de 30 kg, tome 1 comprimido 1 vez al día con un vaso de agua, con o sin alimentos.

No administrar **Loradina** a niños menores de 6 años o niños de 6 a 12 años que pesen menos de 30 kg. Hay otras formulaciones más apropiadas para niños.

Uso en poblaciones especiales

Adultos y niños con problemas graves de hígado que pesen más de 30 kg, tome 1 comprimido 1 vez al día y en días alternos con un vaso de agua, con o sin alimento.

Si olvidó tomar Loradina

Es importante tomar **Loradina** como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si toma más Loradina del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T. No son de esperar problemas graves, sin embargo, puede tener dolor de cabeza, palpitaciones o sentir somnolencia.

Presentación de Loradina

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir en dosis iguales.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30° C

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar entre 15° C y 30° C, en lugar seco.

Spefar S.A. Av. Millán 3907 – Montevideo

Industria Uruguaya

3563-23/04/19

3563

Spefar

hM Digital

654 C

3563 Loradina

FORMATO	SOPORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
104x139	Mayor a 60 g/m ²	23/04/19	23/04/19	104 mm en 3

1 Tinta Pantone / 654 C

