

# Ampicilina Spefar

Spefar

## Ampicilina 500 mg

### Cápsulas

#### Vía oral

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.**

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

#### Fórmula

Cada cápsula contiene: Ampicilina 500 mg; Excipientes c.s.

#### ¿Qué es AMPICILINA SPEFAR y para qué se utiliza?

La ampicilina es una penicilina semisintética derivada del núcleo 6-aminopenicilánico, de acción bactericida, que actúa durante el periodo de multiplicación bacteriana, inhibiendo la biosíntesis del muco péptido de la pared celular.

Las dosis usuales producen concentraciones terapéuticas en suero y diversos líquidos del organismo, que fundamentan su utilización en las indicaciones que se señalan. Penetra en el líquido cefalorraquídeo cuando las meninges están inflamadas. Se elimina por la orina y bilis en altas concentraciones, en forma biológicamente activa.

Posee un amplio espectro de actividad antibacteriana frente a gérmenes gram-positivos y gram-negativos, habiéndose comprobado su frente a:

- Gram-positivos: Streptococcus sp, Diplococcus pneumoniae y Staphylococcus no productores de penicilinas
- Gram-negativos: Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonella sp, Shigella sp, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis.

AMPICILINA SPEFAR está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por cepas sensibles de los microorganismos anteriormente citados, tales como:

- Infecciones otorrinolaringológicas, infecciones respiratorias, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones genito-uritarias, meningitis, endocarditis bacteriana y septicemia.

#### No tome este medicamento si:

- es alérgico a las penicilinas
- tiene mononucleosis infecciosa

#### Tenga precaución si:

- es alérgico a las cefalosporinas
- tiene antecedentes alérgicos, fundamentalmente medicamentoso.

#### Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Estudios en animales no revelaron evidencias de alteraciones sobre la fertilidad, o daño al feto debidos a la penicilina. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. La ampicilina se deberá usar en el embarazo sólo cuando sea claramente necesario. Se excreta en la leche materna, valorar riesgo-beneficio.

#### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

No debe asociarse con:

- alopurinol, por riesgo de reacciones cutáneas
- antibióticos bacteriostáticos, por la posibilidad de producirse un antagonismo
- Metotrexato, porque puede aumentar toxicidad de Metotrexato
- Entacapona, porque puede disminuir la excreción de Entacapona y así aumentar sus niveles en sangre

Puede disminuir la eficacia de Anticonceptivos Orales

#### Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, AMPICILINA SPEFAR puede producir efectos no deseados.

- Puede presentarse reacciones alérgicas, urticaria y erupciones eritematosas, cuya incidencia es mayor en pacientes afectados de mononucleosis infecciosa
- Se ha comunicado leucopenias, neutropenias y eosinofilia normalment reversibles
- Se ha comunicado elevación moderada de transaminasas séricas, especialmente en niños, que remiten al cesar el tratamiento
- Puede producirse alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea
- En caso de aparecer sobreinfecciones producidas por gérmenes resistentes, debe suspenderse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada.

#### ¿Cómo tomar AMPICILINA SPEFAR?

La dosis depende de la severidad y localización de la infección.

Como pauta usual puede seguirse la siguiente:

Adultos

- 500 a 1000 mg cada 6 horas.

Niños

- lactantes: 50-100 mg/kg/día
- 1 a 14 años: 100-200 mg/kg/día repartidos cada 6 horas

#### Si toma más AMPICILINA SPEFAR de lo que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

#### Presentación

Envases conteniendo 16 cápsulas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.  
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

Ley 15443 Reg. Lab. No 83 Reg. M.S.P. No 25810

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q.F. Alicia Cayota

Guardar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) en lugar seco.

Fabricado por **Roemmers S.A.**, Cno. Maldonado 5634, Montevideo - Uruguay.

Para **Spefar S.A.**, Av. Millán 3907 - Montevideo - Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

☎ 0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página: [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com)  
O envíenos un correo a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com)  
 Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

5728-02/08/17

## Ampicilina Spefar - 5728

1 tinta = Pantone 654 C

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
5728	160x130	02/08/17	02/08/17	PAP	130 mm en 4

Diseño Gráfico HM Digital

654 C