

Mulsi D₃ 2000

Spefar

Vitamina D₃ 2000 UI

Comprimidos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada comprimido contiene: Vitamina D₃ (Colecalciferol) 2000 U.I.; Excipientes: Lactosa 132,6 mg; otros c.s.

¿Qué es Mulsi D₃ 2000 y para qué se utiliza?

Mulsi D₃ 2000 contiene colecalciferol (vitamina D₃). La vitamina D₃ puede encontrarse en determinados alimentos, además de producirla la piel en presencia de luz solar. La vitamina D₃ ayuda a los riñones y al intestino a absorber el calcio y contribuye al desarrollo de los huesos. La falta de vitamina D₃ es la causa principal del raquitismo (una mineralización defectuosa de los huesos en niños) y de la osteomalacia (una mineralización inadecuada de los huesos en adultos).

Mulsi D₃ 2000 se usa para: Prevenir y tratar la deficiencia de vitamina D₃ en adultos y niños.

Su médico puede recetarle este medicamento como complemento a una medicación específica para la pérdida del hueso.

No tome este medicamento si:

- es alérgico a la vitamina D₃
- tiene niveles elevados de calcio en la sangre (hipercalcemia) o en la orina (hipercalcúria)
- tiene piedras en los riñones (cálculos renales)
- tiene niveles elevados de vitamina D₃ en la sangre (hipervitaminosis D)

Tenga precaución si:

- está tomando determinados medicamentos usados para tratar los trastornos cardíacos (p. ej., glucósidos cardíacos, como la digoxina)
- padece sarcoidosis (un trastorno del sistema inmunitario que puede provocar un aumento de los niveles de vitamina D en el organismo)
- está tomando otros medicamentos que contengan vitamina D, o si toma alimentos o leche enriquecidos con vitamina D
- es probable que tenga una exposición elevada a la luz solar mientras toma este medicamento
- toma suplementos adicionales que contienen calcio, ya que podría desarrollar piedras en el riñón. Su médico controlará los niveles sanguíneos de calcio para asegurarse de que no son demasiado elevados mientras toma **Mulsi D₃ 2000**
- está tomando de forma simultánea aportes complementarios de calcio o fosfato, dado que existe un aumento del riesgo de presentar niveles de calcio elevados en sangre (hipercalcemia)
- tiene problemas de riñón o alguna enfermedad renal. Es posible que su médico quiera medir sus niveles de calcio en sangre o en orina.

Su médico deberá controlar su nivel de calcio en la sangre mediante pruebas analíticas si toma una dosis equivalente a una dosis diaria de vitamina D₃ superior a 1.000 UI durante un periodo de tiempo prolongado.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Durante el embarazo, la toma diaria de vitamina D no deberá ser superior a 600 UI. **Mulsi D₃ 2000** solo se usará durante el embarazo, si el déficit de vitamina D se ha diagnosticado clínicamente.

Mulsi D₃ 2000 se puede usar durante la lactancia. La vitamina D₃ pasa a la leche materna. Esto se deberá tener en consideración cuando se administre vitamina D adicional al lactante.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito que la vitamina D₃ tenga efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

- Medicamentos que actúan en el corazón o en los riñones, como glucósidos cardíacos (p. ej., digoxina) o diuréticos (p. ej., bendroflumetiazida). Cuando se toman al mismo tiempo que la vitamina D₃, estos medicamentos pueden provocar un aumento sustancial del nivel de calcio en la sangre y la orina
- Medicamentos que contienen vitamina D o si toma alimentos ricos en vitamina D, como algunos tipos de leche enriquecida con vitamina D
- Actinomicina y antifúngicos imidazólicos (p. ej., clotrimazol y ketoconazol). Estos medicamentos pueden afectar a la forma en la que su organismo procesa la vitamina D₃
- Los siguientes medicamentos, dado que pueden interferir en el efecto o la absorción de la vitamina D₃:
 - medicamentos antiepilépticos (anticonvulsivos), barbitúricos; o glucocorticoides (hormonas esteroideas como la hidrocortisona o la prednisolona). Estos medicamentos pueden reducir el efecto de la vitamina D₃

6422-08/04/19

6422

6422 Mulsi D₃ 2000

Spefar

FORMATO
130x180

SOPORTE
50 g/m²

ACTUALIZACIÓN
08/04/19

APROBACIÓN
08/04/19

PLEGADO

1 Tinta Pantone / 2757 C

SIN PLEGAR

HM Digital

2757 C

- medicamentos que reduzcan el nivel de colesterol en la sangre (como la colestiramina o el colestipol)
- medicamentos para la pérdida de peso que reducen la cantidad de grasa que absorbe el organismo (ej. orlistat)
- determinados laxantes (como la parafina líquida)

Toma de Mulsí D3 2000 con los alimentos y bebidas

Mulsí D3 2000 se puede tomar con alimentos.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Mulsí D3 2000** puede producir efectos no deseados.

Deje de tomar **Mulsí D3 2000** y busque asistencia médica inmediatamente si experimenta síntomas de reacción alérgica grave, como:

- hinchazón en la cara, los labios, la lengua o la garganta
- dificultad para tragar
- urticaria y dificultad para respirar

Los posibles efectos adversos pueden incluir:

Poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas): Demasiado calcio en la sangre (hipercalcemia); demasiado calcio en la orina (hipercalciuria)

Raros (afectan a menos de 1 de cada 1000 personas): Erupción en la piel; picazón; Urticaria

Cómo tomar Mulsí D3 2000

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Mulsí D3 2000** indicadas por su médico.

Su médico deberá definir la dosis necesaria en su caso.

Dosis recomendada: 1 comprimido al día.

La dosis diaria no debe superar los 5 comprimidos.

La ranura del comprimido sirve únicamente para fraccionarlo y facilitar la deglución.

Uso en pacientes con insuficiencia renal

Mulsí D3 2000 no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal grave, dado que la vitamina D en forma de colecalciferol no se metaboliza de forma normal y deben usarse otras formas de vitamina D.

Uso en pacientes con insuficiencia hepática

No se requiere un ajuste de la dosis.

Uso en pacientes de edad avanzada

Deberá realizarse un control especial de los niveles de calcio en suero y orina y de la función renal en los pacientes de edad avanzada. Consulte con su médico.

Si olvidó tomar Mulsí D3 2000

Es importante tomar **Mulsí D3 2000** como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si toma más Mulsí D3 2000 del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Los síntomas más frecuentes de una sobredosis son: náuseas, vómitos, sed excesiva, producción de grandes cantidades de orina durante 24 horas, estreñimiento y deshidratación, así como niveles elevados de calcio en la sangre y la orina (hipercalcemia e hipercalciuria) observados en las pruebas analíticas.

Presentación de Mulsí D3 2000

Envase conteniendo 30 comprimidos ranurados.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C). Proteger de la luz.

Industria Uruguaya.

Fabricado por Laboratorios Celsius S.A.

Av. Joaquín Suárez 3593. Montevideo, Uruguay.

Para Spefar S.A.

Av. Millán 3907 – Montevideo, Uruguay.

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

6422-08/04/19

6422	6422 Mulsí D3 2000				
 HM Digital	FORMATO	SOPORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
	130x180	50 g/m²	08/04/19	08/04/19	SIN PLEGAR
	1 Tinta Pantone / 2757 C				
2757 C					