

Moxifar



Amoxicilina

Comprimidos y Polvo para suspensión

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Moxifar 500 comprimidos: cada comprimido contiene: Amoxicilina 500 mg (como trihidrato); excipientes c.s.

Moxifar 750 comprimidos: cada comprimido contiene: Amoxicilina 750 mg (como trihidrato); excipientes c.s.

Moxifar 250 suspensión: cada 5 mL (1 dosis) contiene: Amoxicilina 250 mg (como trihidrato); como conservador Metilparabeno; como edulcorante Azúcar 2,1 g; otros excipientes c.s.

Moxifar 500 suspensión: cada 5 mL (1 dosis) contiene: Amoxicilina 500 mg (como trihidrato); como conservador Metilparabeno; como edulcorante Azúcar 1,8 g; otros excipientes c.s.

¿Qué es Moxifar y para qué se utiliza?

Moxifar es un antibiótico cuyo principio activo es la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico del grupo de las penicilinas.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

Moxifar está indicado para tratar infecciones causadas por bacterias en distintas partes del cuerpo.

- Infecciones del tracto respiratorio: amigdalitis, sinusitis, otitis media, bronquitis, neumopatías.
- Infecciones genitourinarias: cistitis, nefritis, uretritis, cervicitis, salpingitis, orquiepididimitis
- Infecciones de piel y partes blandas: piodermitis, forunculosis, heridas infectadas, erisipela, infecciones de tejido subcutáneo.
- Gonorrea
- Infecciones de cavidad bucal: periodontitis, forunculosis, gingivitis, infecciones de origen dentario.

6536-10/07/19

- Prevención de endocarditis en pacientes susceptibles antes de maniobras odontológicas prolongadas.

Moxifar también se puede usar en combinación con otros medicamentos para tratar úlceras de estómago.

No tome este medicamento si:

- Es alérgico a la amoxicilina, penicilina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a cualquier otro antibiótico. Esto podría incluir erupción en la piel o hinchazón de la cara o la garganta.

Tenga precaución si:

- Tiene mononucleosis infecciosa (fiebre, dolor de garganta, glándulas hinchadas y cansancio extremo).
- Tiene problemas de riñón.
- No orina regularmente.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Información importante sobre algunos de los componentes de Moxifar

Moxifar 250 suspensión contiene 2,1 g de edulcorante Azúcar cada 5 ml de suspensión (500 mg por ml).

Moxifar 500 suspensión contiene 1,8 g de edulcorante Azúcar cada 5 ml de suspensión (500 mg por ml).

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

- Alopurinol - puede ser más probable que sufra una reacción alérgica en la piel.
- Probenecid - su médico puede que le ajuste la dosis de **Moxifar**.
- Anticoagulantes (como la warfarina) - pueden ser necesarios más controles de sangre.
- Otros antibióticos (como tetraciclina) - **Moxifar** puede ser menos eficaz.
- Metotrexato - **Moxifar** puede producir un aumento en los efectos adversos

Toma de Moxifar con los alimentos y bebidas

Moxifar se puede tomar con o sin alimentos.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Moxifar** puede producir efectos no deseados.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas) - Si cualquiera de los siguientes síntomas aparece deje de tomar el medicamento y vaya a ver a su médico inmediatamente:

- Reacciones alérgicas, los signos pueden incluir: picor de la piel o erupción, hinchazón de la cara, labios, lengua, cuerpo o dificultades para respirar. Estos pueden ser graves y, en algunas ocasiones, se han producido muertes.
- Erupción en la piel o puntos redondos rojos planos como la punta de un alfiler bajo la superficie de la piel o moretones en la piel. Esto es debido a la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos debido a una reacción alérgica. Puede estar asociada a dolor de las articulaciones (artritis) y a problemas en los riñones.
- Reacción alérgica retrasada al cabo de 7 a 12 días tras tomar **Moxifar**, algunos signos incluyen: erupciones, fiebre, dolor de las articulaciones y agrandamiento de los nódulos linfáticos especialmente bajo los brazos.

MOXIFAR (6536)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	PLEGADO		SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA
6536	160 x 130 mm	130 mm en 4		PAP	10/07/2019	10/07/2019	PANTONE 654 C

- Eritema multiforme - una reacción de la piel en la que puede desarrollarse: ronchas moradas o rojizas con picazón, especialmente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, áreas hinchadas abultadas en la piel, tejidos blandos en la superficie de la boca, ojos y genitales. Puede tener fiebre y estar muy cansado.
- Otras reacciones de la piel graves pueden incluir: cambio en el color de la piel, bultos bajo la piel, ampollas, granos con pus, descamación, enrojecimiento, dolor, picazón. Estas pueden estar asociadas a fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal.
- Fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros signos de infección, o aparición de moretones con facilidad. Estos pueden ser signos de un problema con sus células de la sangre.
- Reacción de Jarisch-Herxheimer que ocurre durante el tratamiento con **Moxiflar** para la enfermedad de Lyme y causa fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y erupción en la piel.
- Inflamación del intestino grueso (colon) con diarrea (algunas veces con sangre), dolor y fiebre.
- Pueden aparecer efectos adversos graves en el hígado. Estos están asociados principalmente a pacientes con tratamientos prolongados, a hombres y a la edad avanzada. Debe avisar a su médico inmediatamente si tiene:
 - Diarrea grave con sangrado.
 - Ampollas, enrojecimiento o moretones en la piel.
 - Orina oscura o heces pálidas.
 - La piel y el blanco de los ojos de color amarillento (ictericia).

Estos pueden ocurrir durante el tratamiento o hasta varias semanas después.

Algunas veces puede sufrir reacciones cutáneas menos graves como:

- erupción moderada con picor (ronchas redondas, de color rosado - rojo), áreas hinchadas con aspecto de ampollas en antebrazos, piernas, palmas, manos o pies. Esto es poco frecuente (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas). Si tiene cualquiera de ellos hable con su médico dado que tendrá que interrumpir su tratamiento.

Otros posibles efectos adversos son:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): erupción cutánea, náuseas, diarrea.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): vómitos.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): candidiasis (vaginal, bucal o cutánea), alteraciones renales, convulsiones (observados en pacientes tratados con dosis altas o con problemas renales), mareos, hiperactividad, cristales en la orina (que pueden aparecer como orina turbia o dificultad de estos síntomas), la lengua puede cambiar de color a amarillo, marrón o negro y puede tener aspecto piloso, anemia, disminución de glóbulos blancos y plaquetas, la sangre puede tardar más de lo normal en coagular.

Cómo tomar Moxiflar

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Moxiflar** indicadas por su médico.

La dosis habitual es:

Niños de menos de 40 kg de peso

Todas las dosis se basan en el peso corporal del niño en kilogramos.

- El médico le indicará cuánto **Moxiflar** debe administrar a su bebé o niño.
- La dosis habitual es de 40 - 90 mg/kg/día, administrado en dos o tres dosis divididas.
- La dosis máxima recomendada es de 100 mg/kg/día.

Adultos, pacientes de edad avanzada y niños de 40 kg de peso o más

La dosis habitual de **Moxiflar** es de 250 a 500 mg tres veces al día o de 750 mg a 1 g cada 12 horas, dependiendo de la gravedad y del tipo de infección.

- Infecciones graves: de 750 mg a 1 g tres veces al día.

- Infección del tracto urinario: 3 g dos veces al día, durante un día.
- Enfermedad de Lyme (infección transmitida por garrapatas): eritema migrans aislado (etapa temprana erupción circular rosa o roja): 4 g al día; manifestaciones sistémicas (etapa tardía con síntomas más graves o cuando la enfermedad se disemina por su cuerpo): hasta 6 g al día.
- Úlceras de estómago: una dosis de 750 mg o una dosis de 1 g, dos veces al día, durante 7 días con otros antibióticos y medicamentos para tratar las úlceras de estómago.
- Para prevenir endocarditis durante la cirugía: la dosis variará dependiendo del tipo de cirugía. Se pueden administrar otros medicamentos al mismo tiempo. Su médico le podrá dar más detalles.
- La dosis máxima recomendada es de 6 g al día.

Insuficiencia renal

Su médico puede indicarle menor dosis.

Si olvidó tomar Moxiflar

Es importante tomar **Moxiflar** como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. No tome la siguiente dosis demasiado pronto, espere al menos 4 horas antes de tomar la siguiente dosis.

Si toma más Moxiflar del que debiera

Si ha tomado más **Moxiflar** del que debe, los signos pueden ser malestar de estómago (náuseas, vómitos o diarrea) o cristales en la orina, que puede observarse como orina turbia o problemas para orinar.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Presentaciones:

Moxiflar 500 comprimidos: envases conteniendo 16 comprimidos.

Moxiflar 750 comprimidos: envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

Moxiflar 250 suspensión: frascos con polvo para preparar 60 mL (12 dosis).

Moxiflar 500 suspensión: frascos con polvo para preparar 70 mL (14 dosis).

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C.

Fabricado por **Roemmers S.A.**

Cno. Maldonado 5634, Montevideo – Uruguay.

Para **Spefar S.A.**

Av. Millán 3907, Montevideo - Uruguay.

Industria Uruguaya.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

 Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

6536-10/07/19

MOXIFLAR (6536)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	PLEGADO		SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA
6536	160 x 130 mm	130 mm en 4		PAP	10/07/2019	10/07/2019	PANTONE 654 C