

# Sualax NF



## Vaselina líquida

Vía oral

## Cápsulas blandas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

### Fórmula

Cada cápsula de SUALAX NF contiene:

Vaselina líquida: 1.1 g

Excipientes: c.s

### ¿Qué es SUALAX NF y para qué se utiliza?

SUALAX NF contiene el principio activo parafina líquida. Actúa como laxante lubricando el intestino, ablandando y plastificando las heces, facilitando así la evacuación intestinal. No es digerible y se absorbe muy poco.

SUALAX NF es un medicamento indicado en el alivio sintomático del estreñimiento ocasional en adultos y adolescentes.

Se debe consultar a un médico si no se produce ninguna deposición después de las 72 horas tras la administración máxima diaria o si empeora o no mejora después de 6 días.

### No tome este medicamento si:

- Si es alérgico a la parafina líquida
- Si sufre apendicitis o su sintomatología (náuseas, vómitos, dolor de estómago o de la parte inferior del abdomen, calambres abdominales)
- Si padece dolor abdominal de origen desconocido
- Si sufre perforación gastrointestinal
- Si sufre obstrucción o hemorragia intestinal
- Si tiene fuertes espasmos intestinales
- Si sufre enfermedades inflamatorias intestinales
- Si tiene diarrea
- Si tiene dificultades o le duele al tragar
- Si sufre alguna hemorragia rectal no diagnosticada
- Si se le ha practicado una colostomía e ileostomía (intervención quirúrgica para eliminar un segmento del colon o del intestino delgado)
- Niños menores de 12 años

### Tenga precaución:

Consulte a su médico antes de empezar a tomar SUALAX NF.

- No tome este medicamento durante periodos prolongados ya que se puede producir tolerancia a la acción laxante y dependencia para conseguir la evacuación
- No tome este medicamento en dosis mayores que las recomendadas
- El uso prolongado de laxantes puede producir un desequilibrio de electrolitos (disminución de determinadas sales en la sangre) e hipotasemia (disminución de los niveles de potasio en sangre), por lo que se recomienda que antes de iniciar el tratamiento, los pacientes estén bien hidratados y que sus niveles de electrolitos (sales en sangre) sean normales
- La concentración de glucosa en sangre puede aumentar tras la administración prolongada de laxantes
- Debe utilizar este medicamento con precaución si presenta cambios repentinos en los hábitos intestinales que persisten más de 2 semanas

### Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Este medicamento no debe ser utilizado durante el embarazo a menos que el beneficio esperado sea superior a los posibles riesgos.

### Conducción y uso de máquinas

No se han descrito efectos sobre la capacidad para conducir o manejar máquinas.

### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.


Este medicamento no debe administrarse en las 2 horas anteriores o posteriores a la toma de otro medicamento, ya que puede interferir la absorción de algunas sustancias como algunas vitaminas (A, D, E, K, etc.), calcio, fósforo y potasio o suplementos de potasio.

6584-14/06/19

## SUALAX NF (6584)

33 36 34  
mm mm mm

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	TINTA	PLEGADO	FRENTE
6584	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	14 / 06 / 2019	PANTONE 654 C	103 mm en 3	FRENTE



Este medicamento no debe administrarse conjuntamente con:

- medicamentos que ayudan a controlar la coagulación de la sangre (anticoagulantes orales derivados de la cumarina o de la indandiona)
- medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca (glucósidos digitálicos)
- hormonas sexuales femeninas (estrógenos)
- anticonceptivos orales
- laxantes ablandadores de las heces (emolientes)

**Toma de SUALAX NF con los alimentos y bebidas**

Este medicamento no debe administrarse en las 2 horas anteriores o posteriores a las comidas, ya que puede interferir la absorción de algunas vitaminas y minerales de los alimentos.

**Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, SUALAX NF puede producir efectos no deseados.

Efectos adversos muy raros (que pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):

- Reacciones alérgicas (erupción cutánea, o hinchazón de la piel, boca o cara, o dificultad al tragar o en la respiración)
- Deshidratación
- Déficit de vitaminas solubles en grasas (vitamina A, D, E y K)
- Un tipo de neumonía llamada neumonía lipoidea
- Pérdida anal de parafina líquida, prurito anal, incontinencia anal
- Agravamiento del estreñimiento
- Dolor abdominal
- Heces acuosas
- Lipogranuloma (nódulo de tejido graso)

**Cómo tomar SUALAX NF**

Siga exactamente las instrucciones de administración de SUALAX NF indicadas por su médico.

Las cápsulas de SUALAX NF deben tomarse con agua, se recomienda 1 o 2 vasos. Debe intentar tomar su dosis diaria aproximadamente a la misma hora cada día, preferentemente en la noche antes de acostarse.

Durante el tratamiento, es necesario que usted ingiera por lo menos de 6 a 8 vasos de líquido diario para ayudar a producir heces blandas y para protegerle frente a la deshidratación. La acción laxante completa se consigue a partir del tercer día después de iniciar el tratamiento. Disminuya progresivamente la dosis a medida que se obtenga el efecto deseado.

Adultos: 2 cápsulas 1 a 2 veces al día. La dosis máxima recomendada es de 6 cápsulas diarias.

Niños: sólo por indicación médica

**Si olvidó tomar SUALAX NF**

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Si toma más SUALAX NF del que debiera**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Si toma más SUALAX NF del recomendado se puede producir eliminación de parafina líquida con las heces, diarrea con pérdida de electrolitos (disminución de determinadas sales en la sangre), calambres, retortijones y debilidad muscular.

**Presentación de SUALAX NF**

Envases conteniendo 12 y 30 cápsulas blandas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.  
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

**En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o escribanos a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.**

**VENTA LIBRE EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS.**

Mantener alejado del alcance de los niños.  
Conservar entre 15° C y 30° C, en lugar seco.  
Producto fabricado por Procaps Colombia, para SPEFAR S.A.  
Av Millán 3907 – Montevideo - Industria Uruguaya.

6584-14/06/19

**SUALAX NF (6584)**

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	TINTA	PLEGADO	DORSO
6584	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	14 / 06 / 2019	PANTONE 654 C	103 mm en 3	

34 mm 36 mm 33 mm