

Perifar Crema

Spefar

Ibuprofeno

Crema

Vía tópica dérmica

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted:

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si necesita consejo o más información, consulte a su médico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar al médico.

Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula:

Cada 100 gs de Perifar Crema contienen: Ibuprofeno 5g. Metilparabeno y Propilparabeno como conservadores. Excipientes: c.s

¿Qué es Perifar Crema y para qué se utiliza?

Perifar Crema es un preparado de aplicación percutánea cuyo principio activo es el ibuprofeno. El ibuprofeno es un AINE con acción analgésica y antiinflamatoria.

Perifar Crema está indicado en adultos y adolescentes desde 12 años de edad para el alivio del dolor y de la inflamación leve y ocasional producida por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones (tirones musculares), torticolis (dolor y rigidez de cuello) u otras contracturas, lumbalgias (dolores en la parte baja de la espalda) y esguinces.

No use este medicamento si:

- es alérgico (hipersensible) al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- tiene una quemadura solar en la zona afectada
- ha sufrido reacciones alérgicas causadas por ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos, como:
 - Reacciones alérgicas de tipo asmático (dificultad para respirar, ahogo, opresión en el pecho y en algunos casos tos o silbidos al respirar)
 - Hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar (angioedema)
 - Otras reacciones alérgicas como: rinitis, picor o urticaria.

Tenga precaución:

- No debe utilizarse sobre mucosas, ni sobre piel con heridas o eccemas
- Aplicar únicamente sobre piel intacta
- Si es asmático o alérgico a algún colorante utilizado en alimentación o medicamentos (como por ejemplo: amarillo-anaranjado, tartrazina, etc.) deberá consultar con su médico antes de utilizar este medicamento
- Evitar el contacto con los ojos y mucosas
- Las zonas tratadas no deben exponerse al sol (aun estando nublado), ni a lámparas de rayos ultravioleta
- No utilizar con vendajes oclusivos
- No aplicar en zonas extensas, ni de forma prolongada. Utilizar exclusivamente en la zona afectada
- No aplicar simultáneamente en la misma zona de la piel en la que se hayan aplicado otros medicamentos

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar a su médico.

Uso en niños

No utilizar este medicamento en niños menores de 12 años, debido a la escasez de datos en esta población.

Conducción y uso de máquinas:

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos y de usar maquinaria cuando se usa externamente sobre la piel.

6595-07/10/19

PERIFAR CREMA (6595)

Spefar

| CÓDIGO | MEDIDAS ABIERTO | PLEGADO |  | SOPORTE | FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA APROBACIÓN | TINTA |
|--------|-----------------|-------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 6595 | 95 x 130 mm | 130 mm en 5 | | Mayor a 60g/m ² | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PANTONE 4625 C |

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Posibles efectos adversos:

Al igual que todos los medicamentos, **Perifar Crema** puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Puede experimentar los siguientes efectos adversos:

- Poco frecuentes: enrojecimiento, picor y sensación de quemazón cutánea en la zona de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.
- Raros: dermatitis (inflamación de la piel) producida por el sol.

Cómo usar Perifar Crema:

Siga exactamente las siguientes instrucciones de administración, a menos que su médico le haya dado otras distintas. **Perifar Crema** es sólo para uso cutáneo (únicamente para aplicarlo sobre la piel).

La dosis normal es:

Adultos y niños mayores de 12 años: aplique una fina capa de **Perifar Crema** en la zona dolorida de 3 a 4 veces al día y realice un ligero masaje para facilitar su penetración.

Lávese las manos después de cada aplicación.

No utilizar más de 7 días seguidos.

Si usa más Perifar Crema de lo que debiera:

Debido a su uso cutáneo, no es probable que se produzcan casos de intoxicación. No obstante, en caso de haber utilizado este medicamento más de lo que debe, o de ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Síntomas de intoxicación pueden ser: náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, vértigo, espasmos (calambres) y bajada de la presión arterial.

Presentación de Perifar Crema:

Pomos conteniendo 20 y 40 grs de crema.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722.

Producto medicinal

Mantener alejado del alcance de los niños

Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Spefar S.A.

Av. Millán 3907, Montevideo, Uruguay

Industria Uruguaya.



Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

6595-07/10/19

PERIFAR CREMA (6595)

| CÓDIGO | MEDIDAS ABIERTO | PLEGADO |  | SOPORTE | FECHA ACTUALIZACIÓN | FECHA APROBACIÓN | TINTA |
|--------|-----------------|-------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 6595 | 95 x 130 mm | 130 mm en 5 | | Mayor a 60g/m ² | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PANTONE 4625 C |