

Perifar

Spedar

GRIP 400

Ibuprofeno 400 mg
 Cafeína 35 mg
 Vitamina C 200 mg
 Comprimidos recubiertos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su médico. Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, debe consultar al médico. Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene: Ibuprofeno 400 mg; Cafeína 35 mg; Vitamina C 200 mg; Excipientes: Lactosa 810 mg; otros c.s.

¿Qué es PERIFAR GRIP y para qué se utiliza?

PERIFAR GRIP contiene ibuprofeno, cafeína y vitamina C. El ibuprofeno es un AINE, actúa reduciendo el dolor y la fiebre. La cafeína tiene una acción estimulante del sistema nervioso, tiene algunas propiedades analgésicas propias (es útil como adyuvante en combinación con el ibuprofeno). La vitamina C es antioxidante y favorece las defensas del organismo.

PERIFAR GRIP se utiliza para el alivio sintomático de los procesos gripales como resfriado común que cursan con fiebre, dolor leve o moderado y/o decaimiento.

No tome este medicamento si:

- es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de PERIFAR GRIP
- sufre úlcera de estómago o duodeno
- ha presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos
- padece o ha padecido asma, rinitis o urticaria
- padece una enfermedad grave del hígado, los riñones o el corazón
- padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea
- vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre
- si está en el último trimestre del embarazo

Tenga precaución

Si ha sufrido enfermedades del estómago o del intestino (ej: úlcera). El dolor de estómago o intestinal no debe tratarse con este medicamento Si al tomar el medicamento nota ardor o dolor de estómago, debe suspender el tratamiento y consultar a su médico.

Si tiene la función renal, cardíaca o hepática reducidas, si padece alteraciones en la coagulación sanguínea o está en tratamiento con anticoagulantes, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento Si tiene problemas de corazón incluida una insuficiencia cardíaca, angina (dolor torácico) o si ha sufrido un ataque al corazón, cirugía de bypass, arteriopatía periférica (problemas de circulación en las piernas o pies debido a un estrechamiento o a un bloqueo de las arterias), o cualquier tipo de ictus (incluido un "mini-ictus" o accidente isquémico transitorio "AIT"). Si tiene la presión arterial alta, el colesterol alto, tiene antecedentes familiares de enfermedad de corazón o ictus, o si es fumador.

6858-04/09/19

Si usted es diabético tenga en cuenta que la cafeína puede alterar los niveles de azúcar en sangre.

El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos que pueden disminuir la fertilidad de la mujer. Este efecto es reversible cuando se deja de tomar el medicamento.

Si padece varicela no deberá tomar ibuprofeno.

En caso de deshidratación, p.ej, diarrea grave o vómitos, tome abundantemente líquido y contacte inmediatamente con su médico.

Si padece porfiria intermitente aguda

Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas

No supere la dosis recomendada ni la duración del tratamiento

Se recomienda limitar el uso de productos que contengan cafeína cuando se esté en tratamiento con este medicamento

padece nefrolitiasis o historia de nefrolitiasis (formación de piedras en los riñones)

padece hiperoxaluria (aumento de la tasa de ácido oxálico en la orina)

Si padece alguna enfermedad del riñón: no debe tomar dosis elevadas de ácido ascórbico porque podrían dañarle

padece hemocromatosis (presencia de demasiado hierro en el cuerpo)

Si padece o ha padecido cálculos (piedras en el riñón) o gota (depósitos de ácido úrico en las articulaciones, sobre todo en los pies); debe tener precaución porque podrían producirse.

Si presenta deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (alteración hereditaria del metabolismo de los glóbulos rojos); puede producirse hemólisis (destrucción de glóbulos rojos).

Si tiene anemia de células falciformes

Si está en tratamiento con anticoagulantes

Si padece alguna afección con sobrecargas de hierro (elevados niveles de hierro en sangre) el consumo de altas dosis de vitamina C podría perjudicarlo.

Uso en niños

No administrar a menores de 18 años sin consultar al médico.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. No se recomienda el uso de PERIFAR GRIP durante el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre el uso de PERIFAR GRIP está contraindicado.

Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo PERIFAR GRIP se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir (efecto es reversible cuando se deja de tomar el medicamento).

Se desaconseja tomar ibuprofeno por periodos prolongados durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Si solamente toma una dosis de PERIFAR GRIP o durante un periodo corto, no es necesario que adopte precauciones especiales. Si experimenta mareo, vértigo, alteraciones de la visión u otros síntomas mientras está tomando este medicamento, no debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.

Información importante sobre algunos de los componentes de PERIFAR GRIP

PERIFAR GRIP contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud. PERIFAR GRIP puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. Por ejemplo:


Otros AINEs: Antiagregantes plaquetarios como ticlopidina; Medicamentos anticoagulantes (p. ej, ácido acetilsalicílico, warfarina, acenocumarol); Medicamentos antihipertensivos (IECAs como captopril, betabloqueantes como atenolol, y antagonistas de los receptores de angiotensina-II como losartán); Lito; Metotrexato; Mifepristona; Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos; Hidantoinas como fenitoína; Sulfamidias como sulfametoxazol y cotrimoxazol; Baclofeno; Corticoides

PERIFAR GRIP (6858)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	TINTA	PLEGADO
6858	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m ²	04/09/2019	PANTONE 4625C	103 mm en 3

33 36 34
mm mm mm

FRENTE



como cortisona y prednisona; Diuréticos; Pentoxifilina; Probenecid; Antibióticos quinolonas como el norfloxacino, y aminoglicósidos como la neomicina; Disulfiram; Hierro; Deferoxamina; Cianocobalamina (vitamina B12); Anticoagulantes hormonales; Antidresivos; Anticóncitos que contienen aluminio; Sulfipirazona; Tacrina; Tacrolimus; Ciclosporina; Zidovudina; Indinavir; Ciclosporina; Trombolíticos; Medicamentos utilizados para disminuir la glucosa en la sangre como hipoglucemiantes orales o insulina; Resinas de intercambio iónico como colestiramina; Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba.

Interferencias con pruebas analíticas

La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio: Tiempo de hemorragia (puede prolongarse); Glucemia (puede disminuir); Aclaramiento de creatinina (puede disminuir); Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir); Concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (puede aumentar); Incremento de valores de transaminasas hepáticas. Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y está tomando o ha tomado recientemente PERIFAR GRIP.

Toma de PERIFAR GRIP con los alimentos, bebidas y alcohol

Puede tomarlo solo o con los alimentos. En general se recomienda tomarlo durante las comidas o con leche para reducir así la posibilidad de que se produzcan molestias en el estómago.

No se debe administrar ibuprofeno con alcohol para evitar dañar el estómago.

Límite el consumo de bebidas que contienen cafeína (café, té, chocolate y bebidas con cola), mientras está tomando este medicamento.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, PERIFAR GRIP puede producir efectos adversos aunque no todos las personas los sufren. A las dosis aconsejadas y respetando las contraindicaciones, los efectos secundarios son muy poco frecuentes.

Los efectos adversos son más comunes en personas mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.

Debido a la presencia de ibuprofeno

Frecuentes: cansancio, dolor de cabeza, trastornos del estómago e intestino (ardor de estómago, diarrea, náuseas, vómitos), trastornos de la piel (erupciones cutáneas, picores) y zumbidos de oídos.

Poco frecuentes: Reacciones alérgicas, asma, rinitis y urticaria, hemorragias y úlceras gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión borrosa, disminución de la agudeza visual o cambios en la percepción del color y alteraciones auditivas.

Raro: (hinchazón por retención de líquidos), alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación de estómago e intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia), depresión, alteraciones del riñón (consistente en nefritis aguda intersticial con hematuria (sangre en orina), proteinuria (eliminación de proteínas por la orina) y ocasionalmente síndrome nefrótico), trastornos de la visión (oscurecimiento de la visión), rigidez de cuello y broncoespasmos (sensación repentina de ahogo), disnea (dificultad para respirar) y angioedema (reacción de la circulación sanguínea que afecta a las capas profundas de la piel con inflamación e hinchazón).
Muy raras: Meningitis séptica (inflamación de las meninges no causada por bacterias), alteraciones de la sangre (anemia aplásica y anemia hemolítica) y de la coagulación, alteraciones graves de la piel, ojos y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme grave) y la necrólisis epidérmica tóxica (lesiones en la piel y mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme. Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como síndrome DRESS. Los síntomas del síndrome DRESS incluyen: erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y eosinófilos elevados (un tipo de glóbulos blancos).

Debido a la presencia de cafeína

Pueden aparecer los siguientes efectos adversos para los cuales no se ha podido establecer la frecuencia exacta: insomnio, inquietud y nerviosismo y dolor de cabeza.

También se han observado: náuseas, vómitos e irritación de estómago. En algún caso también puede producirse hiperglucemia o hipoglucemia (aumento o disminución de glucosa en sangre).

El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente, en el caso en el que el paciente experimente algún episodio de mareos o palpitaciones. Dosis altas de cafeína pueden provocar palpitaciones, taquicardia e aumento de la presión arterial.

Debido a la presencia de vitamina C

Dosis excesivas de vitamina C (más de 2 g por día) pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales. Asimismo, existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

Cómo tomar PERIFAR GRIP

Siga exactamente las instrucciones de administración de PERIFAR GRIP indicadas por el médico. El médico le indicará la dosis y duración del tratamiento.

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe tomar PERIFAR GRIP más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Este medicamento se administra por vía oral. Los comprimidos de PERIFAR GRIP deben tomarse con agua. Los pacientes con molestias de estómago deben tomar el medicamento con leche o durante las comidas. Espere al menos 4-6 horas entre dosis consecutivas.

Menores de 18 años: consultar al médico.

Adultos: uno comprimido cada 8 horas. Dosis máxima diaria: 1 comprimido cada 6 horas (2400 mg de ibuprofeno).

Mayores de 65 años: la posología debe ser establecida por el médico, ya que cabe la posibilidad de que se necesite una reducción de la dosis habitual.

Pacientes con enfermedad cardíaca, renal y hepática: es posible que el médico le recete una dosis más baja de lo habitual. Si es así, tome la dosis exacta que éste le haya prescrito.

Si toma más PERIFAR GRIP de lo que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.J.A.T.

Los síntomas de sobredosis son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, indiferencia, sueño, dolor de cabeza, movimientos involuntarios rápidos del ojo, zumbido de oídos, falta de coordinación, palpitaciones, taquicardia, aumento de la presión arterial. Es raro que aparezcan síntomas más graves como hemorragia intestinal, bajada de la presión, bajada de la temperatura corporal, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de la función renal, coma, síndrome disneico agudo del adulto y parada transitoria de la respiración en niños (después de ingerir grandes cantidades).

En caso de ingestión de cantidades importantes deberá administrarse carbón activado. El vaciado gástrico se planteará si ha ingerido cantidades importantes y durante los 60 minutos siguientes a la ingestión.

Presentación

Envases conteniendo 8 y 16 comprimidos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación llamar al C.J.A.T. - Tel.: 1722.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimatlam.com o escribanos a contacto@ciatlam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Mantener alejado del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C.

Spear S.A.

Av. Millán 3907 - Montevideo

Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

6858-04/09/19

PERIFAR GRIP (6858)

34 36 33
mm mm mm

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	TINTA	PLEGADO	FRENTE
6858	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m ²	04/09/2019	PANTONE 4625C	103 mm en 3	