

interrumpirse el tratamiento si aparecen signos de vasoconstricción periférica. El tratamiento prolongado puede provocar fibrosis en pleura, peritoneo o válvulas cardíacas. *Sobredosis:* el ergotismo es una vasoconstricción arterial intensa produciendo signos y síntomas de isquemia como frialdad, hormigueo, cianosis, ausencia de pulso, si no se trata puede llevar a la gangrena. La isquemia puede ser en extremidades o tejidos como riñón, cerebro, miocardio. *Efecto sobre capacidad para conducir y utilizar máquinas:* puede afectar la capacidad de conducir y utilizar máquinas ya que puede producir somnolencia, mareos y debilidad.

Precauciones
Migra Perifar debe ser empleado con precaución en enfermedad ulcerosa gastroduodenal en actividad. Al igual que otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el Ibuprofeno puede agravar el broncoespasmo en pacientes asmáticos. Existe una interacción entre Ibuprofeno y ácido acetilsalicílico, por lo que no es recomendable que ambos fármacos se administren en forma simultánea. Los agentes inhibidores de la síntesis de prostaglandinas presentan reacción cruzada en pacientes con síndrome de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico. No debe consumir este producto por períodos prolongados, ni a dosis superiores a las recomendadas, ya que puede aumentar el riesgo de isquemia inducido infarto de miocardio. Tampoco está indicada para prevención de migraña. Si observa síntomas como hormigueo en los dedos de manos y pies, interrumpa el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico. Se han comunicado casos de abuso de este medicamento, así como dependencia psicológica en pacientes en tratamiento con Tartrato de Ergotamina y Cafeína. Debido a la cronicidad de dolores de cabeza vasculares, es necesario que los pacientes no sobrepasen las dosis recomendadas con el uso a largo plazo para evitar los efectos adversos asociados. Puede dar positivo en el control de dopaje. *Embarazo y lactancia:* durante el embarazo y lactancia no debe usar este producto. *Población pediátrica:* no utilizar en menores de 6 años. *Población anciana:* debe usarse con precaución ya que son más sensibles a los efectos isquémicos de ergotamina.

Interacciones medicamentosas
No usar con los siguientes medicamentos que inhiben la CYP3A4 ya que se ha producido casos de ergotismo grave (isquemia cerebral y/o de las extremidades):
- antibióticos macrólidos como Eritromicina y Claritromicina (no Azitromicina),
- medicamentos para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), como por ejemplo Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Amprenavir),
- medicamentos para el tratamiento de las infecciones micóticas, como por ejemplo Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol.
Además también deben vigilarse las siguientes interacciones:
- medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial,
- nicotina (como en fumadores),
- otros medicamentos para el tratamiento de la migraña como Sumatriptán.
El uso excesivo de Ergotamina puede hacer más frecuentes e intensos los ataques de migraña.

Posología
Según prescripción médica.
Como dosis de orientación se recomiendan 2 comprimidos en una misma toma al inicio de los pródomos o de los síntomas y 1 comprimido 30 minutos después, en caso de que no ceda, sin exceder los 6 comprimidos diarios. En el tratamiento de la migraña la máxima dosis diaria de Ergotamina es de 6 mg. No puede superarse los 10 mg en la semana.
Como tratamiento de mantenimiento se sugiere 1 comprimido cada 6-8 horas.
En caso de emplearse durante tiempo prolongado, la dosis de *Migra Perifar* debe ser reducida en forma paulatina, debido a que el Tartrato de Ergotamina no puede ser suprimido en forma abrupta.

Presentación
Envases conteniendo 8 y 16 comprimidos.

Ley 15443, Reg. Lab. Nº 83, Reg. M.S.P. Nº 37119
CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Guardar a temperatura ambiente, inferior a 30° C, en lugar seco.
D.T.: Quím. Farm. Alicia Cayota
Spedar S.A. Av. Millán 3907 - Montevideo
Industria Uruguaya.

059 [4] /16

Migra Perifar

Ibuprofeno, Cafeína, Ergotamina
Antiaquecoso

Comprimidos recubiertos
Vía oral

Fórmula
Cada comprimido recubierto contiene:
Ibuprofeno 400 mg; Cafeína 100 mg; Ergotamina tartrato 1 mg; excipientes c.s.

Indicaciones
Migra Perifar es un antimigrañoso diseñado específicamente para el tratamiento de la jaqueca o migraña en cualquiera de sus múltiples formas. La jaqueca es un tipo de cefalea que se presenta en forma de accesos periódicos y repetidos, de causa vasomotora o angioneurótica, casi siempre hemisférica y en el caso de la migraña simple, sin trastornos neurológicos funcionales acompañantes, o en el caso de la migraña clásica, precedida de pródomos (escotomas centellantes, parestesias, limitaciones del campo visual) y acompañada de fotofobia, náuseas y vómitos. *Migra Perifar* está indicado también en otras formas de migraña, dentro de las que se destacan: el equivalente migrañoso, la migraña digestiva, núcual oftálmica, oftalmopléjica y la migraña roja, conocida también como cefalea histamínica.

Mecanismo de acción
Tal como se señala, la fórmula de *Migra Perifar* reúne en un único fármaco tres principios activos para el tratamiento de la jaqueca.

Ibuprofeno
El Ibuprofeno es un potente analgésico de acción central, rápido y seguro para el tratamiento del dolor leve a moderado de cualquier origen.

Cafeína
La Cafeína es un estimulante clásico del sistema nervioso central. Potencia la acción del Ibuprofeno, a través de un comienzo más rápido del efecto analgésico. Refuerza la acción del Tartrato de Ergotamina posiblemente porque mejora la velocidad y el grado de su absorción. La dosis de 100 mg de Cafeína mantiene todas las ventajas como estimulante y exaltador de la acción analgésica, sin producir excitación indeseable.

Ergotamina
Vasoactivo cerebral. Es un agente importante en el tratamiento del dolor de la jaqueca, en especial en aquellos pacientes que obtienen alivio incompleto con Ibuprofeno u otros analgésicos. Es eficaz en la gran mayoría de los casos de jaqueca y es específico ya que no actúa en otros tipos de cefalea. Disminuye la amplitud de la pulsación de las arterias craneanas, en especial de las ramas meníngeas de la carótida externa y promueve el cierre de las anastomosis arteriovenosas, lo que provoca disminución pronunciada de la resistencia al flujo en los territorios irrigados por la arteria carótida interna durante la crisis jaquecosa.

Contraindicaciones
Migra Perifar está contraindicado en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes. Tercer trimestre del embarazo. Alergia a alguno de los componentes de *Migra Perifar*. Trastornos circulatorios periféricos (como arteritis obliterante, síndrome de Raynaud), cardiopatía isquémica (como angor, o si padeció infarto de miocardio), hipertensión arterial mal controlada, insuficiencia hepática o renal severa, arteritis temporal, migraña acompañada de sintomatología neurológica (migraña hemipléjica).

Efectos adversos
Puede provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolores musculares, sensaciones parestésicas (hormigueo y entumecimiento) en dedos de las manos y pies. Ocasionalmente edema y prurito en personas hipersensibles. Debe



MIGRAPERIFAR

FECHA ACTUALIZACIÓN	MEDIDAS	TINTAS	APROBADO
21/ 09 /2016	103 x 138 mm	PANTONE 4625 U	23/ 09 /2016