

Cortifar

Betametasona 0,1% Solución en spray Vía tópica dérmica

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada 1 ml de CORTIFAR spray contiene: Betametasona (como valerato) 1 mg. Excipientes: c.s.

¿Qué es CORTIFAR y para qué se utiliza?

CORTIFAR spray contiene como principio activo betametasona valerato, que es un corticosteroide (antiinflamatorio), que aplicado en la piel reduce el enrojecimiento, la inflamación y la picazón causados por determinados problemas de la piel.

CORTIFAR spray está indicado para el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas (con picazón) de las afecciones de la piel que responden a los corticosteroides, tales como:

- Dermatitis atópica y neurodermatitis (también llamado liquen simple, placas con picazón en la piel causadas por rascado)
- Dermatitis de contacto alérgica o irritativa (erupción cutánea debida a alergia o a sustancias que irritan la piel)
- Dermatitis numular (eccema discoide) (erupción en forma de moneda)
- Eccema dishidróico (erupción con picazón en manos y pies)
- Psoriasis (afección escamosa rojiza con frecuencia cubiertas por escamas plateadas), excluyendo psoriasis con placas extendidas
- Dermatitis seborreica (erupción con inflamación y descamación)
- Liquen plano (afección de la piel con picazón, con papúlas o elevaciones pequeñas violáceas)
- Lupus eritematoso discoide (enfermedad que afecta a la piel y suele afectar a la cara u otras partes y suele presentar placas rojizas que pueden dejar cicatriz)

CORTIFAR spray está especialmente indicado para el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de las afecciones del cuero cabelludo

CORTIFAR spray está indicado en adultos y niños mayores de 12 años.

No use este medicamento:

- Si es alérgico a la betametasona, a otros corticosteroides o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- Si padece infecciones en la piel (por bacterias o virus)
- Si tiene rosácea (afección de la piel de la cara con inflamación roja/rodrada)
- En los ojos
- En acné
- En úlceras o heridas abiertas
- En picazón alrededor del ano o genitales
- No use este medicamento en niños menores de 12 años

SC0033-19/07/19

Tenga precaución:

Consulte a su médico antes de empezar a usar CORTIFAR spray. Si se produce dermatitis alérgica de contacto, debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico

- Si desarrolla una infección durante el tratamiento debe consultar al médico sobre su tratamiento y si se extiende la infección se debe interrumpir el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada
- Con el uso de corticosteroides tópicos se pueden producir cualquiera de los efectos adversos que se han notificado sobre el uso de corticosteroides por vía oral por ejemplo, como la alteración de las glándulas suprarrenales que produce la aparición de síntomas como obesidad, retraso en el crecimiento en niños, etc, (síndrome de Cushing)
- Para disminuir el riesgo de efectos adversos:
 - Evite el uso de grandes dosis de CORTIFAR spray y durante largos periodos de tiempo
 - No aplique este medicamento en zonas amplias de piel
 - No utilice un vendaje oclusivo sobre el medicamento, excepto si su médico se lo ha indicado y bajo su supervisión
 - Si se tuviese que aplicar CORTIFAR spray en la cara, la duración del tratamiento debe ser la menor posible, una semana como máximo, ya que puede causar atrofia (adelgazamiento) de la piel
 - Evite que el producto entre en contacto con los ojos
 - Este medicamento no debe aplicarse en heridas abiertas ni mucosas (ej., la nariz o la boca), ni en áreas con adelgazamiento de la piel (atrofia)
- Si está tratándose una psoriasis, se recomienda una estricta supervisión médica de su enfermedad a fin de observar un posible empeoramiento,
- CORTIFAR spray es inflamable (puede arder). Mantener alejado del calor, fuego, llamas y no fume mientras se aplica el medicamento o después de su aplicación. No utilice secador de pelo después de aplicar CORTIFAR spray.

Niños y adolescentes

Este medicamento está contraindicado en niños menores de 12 años.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

CORTIFAR spray no debería utilizarse durante el embarazo excepto si el beneficio para la madre justifica el riesgo potencial sobre el feto. Como norma general, durante el primer trimestre de embarazo no se debe aplicar CORTIFAR spray. Las mujeres embarazadas o que planeen quedarse embarazadas no lo deben aplicar en amplias zonas de la piel, ni en periodos de tiempo prolongados, ni utilizar vendajes oclusivos.

Lactancia

Si está dando el pecho, debe comunicárselo a su médico antes de usar CORTIFAR spray. Durante la lactancia se podría considerar el uso de CORTIFAR spray cuando el beneficio esperado para la madre supere el riesgo potencial para el bebé.

Conducción y uso de máquinas

El tratamiento con CORTIFAR spray no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Los tratamientos en áreas extensas de la piel o los de larga duración con corticosteroides podrían dar lugar a interacciones similares a las que se producen con el tratamiento sistémico (pasando al interior del cuerpo directamente), debido a su absorción.

SC0033 - CORTIFAR SPRAY PROSPECTOS DOBLADOS ND

CÓDIGO	FORMATO	SOPORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
SC0033	95x130	Mayor a 60 g/m ²	19/07/19	19/07/19	130 mm en 5
TINTA: Pantone 654 C					
654 C					

Téc.DG - Marcos Robledo - Consultas: 098144645 - robledo89@gmail.com



Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, CORTIFAR spray puede producir efectos no deseados.

Si se absorbe suficiente cantidad de medicamento a través de la piel y pasa a sangre, se pueden producir efectos adversos que afectan a su piel y a otras partes del cuerpo. Si las lesiones de la piel empeoran o se inflaman durante el tratamiento, puede que sea alérgico al medicamento, tener una infección o necesitar otro tratamiento. Interrumpa el tratamiento y consulte con su médico.

Efectos adversos que se han comunicado:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Picazón de piel
- Quemazón local en la piel
- Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): El uso de CORTIFAR spray durante largos periodos de tiempo, o bajo vendajes oclusivos puede causar los siguientes efectos:
 - Adelgazamiento de la piel (atrofia)
 - Estrías
 - Sequedad de la piel
 - Reacción alérgica de la piel en el lugar de aplicación (dermatitis de contacto)
 - Aparición de vasos sanguíneos bajo la superficie de la piel (telangiectasias)
 - Acné
 - Pérdida de cabello
 - Aumento del vello corporal
 - Cambios en el color de la piel
 - Dolor o irritación en el lugar de aplicación
 - Empeoramiento de las lesiones
 - Enrojecimiento
 - Erupción o urticaria
 - Infección en la piel
 - Cara redondeada
 - Acumulación de grasa en la zona cervical
 - Retraso en la cicatrización
 - Síntomas psiquiátricos
 - Obesidad
 - Hipertensión arterial

Frecuencia desconocida:

- Cataratas
- Glaucoma (aumento de la presión ocular)
- Infección por hongos en piel o mucosas
- Inflamación específica de la piel alrededor del labio superior y en la barbilla (dermatitis perioral)
- Inflamación de folículos pilosos
- Hematomas
- En niños también se han observado los siguientes síntomas muy raros:
 - Retraso en la ganancia de peso y el crecimiento
 - Aumento de la presión dentro del cráneo

Efectos adversos que se han observado en los análisis de sangre:

- Niveles aumentados de azúcar en sangre u orina o aumento del colesterol y otras grasas.

Cómo usar CORTIFAR spray

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

La dosis recomendada es:

Adultos y niños a partir de 12 años

CORTIFAR spray está especialmente indicado para afecciones húmedas o que segreguen líquido. Se recomienda aplicar CORTIFAR spray dos veces al día (por la mañana y la noche). La cantidad de aplicaciones puede reducirse en función de la mejoría. Se puede mantener entonces el tratamiento mediante la aplicación una vez al día, o menor frecuencia (en días separados, por ej), para posteriormente interrumpir el tratamiento.

Este medicamento no debe utilizarse durante más de 2 semanas seguidas con la dosis máxima (2 veces al día).

Instrucciones para la aplicación:

- Abrir el frasco de solución y colocar la boquilla sobre la zona de piel o del cuero cabelludo que se vaya a tratar
- Presione ligeramente el frasco aplicando el producto directamente en el cuero cabelludo para cubrir todo el área a tratar con una fina capa de líquido. Puede extenderlo o no con un ligero masaje
- Sentirá una ligera sensación de frío hasta que el líquido se seque. Si se lava el cabello, aplicar CORTIFAR spray después de secarlo. Si el tratamiento fuese en la cara, la duración del tratamiento debe ser la menor posible, 1 semana como máximo. El medicamento se debe aplicar utilizando sólo la cantidad necesaria para cubrir el área afectada y se puede extender mediante un masaje suave. Lávese las manos después de la aplicación de la solución. No cubrir la zona con un vendaje u otro material no transpirable, excepto que se lo haya indicado el médico, bajo su supervisión. **Uso en niños y adolescentes**
No aplicar CORTIFAR spray en niños menores de 12 años de edad.

Si usa más CORTIFAR spray del que debiera

Si se aplica más cantidad de CORTIFAR spray (sobredosis repetidas) se pueden producir efectos adversos. Si ingiere una cantidad grande de CORTIFAR spray, aclárese la boca con abundante agua y contacte con su médico para que le aconseje.

Si utiliza la solución más a menudo de lo que debería o en zonas de la piel, se puede absorber pasando al interior del cuerpo y producirle diversos trastornos; en los niños, esto puede afectar su crecimiento y desarrollo.

En los casos de toxicidad crónica, se aconseja que los corticoides sean retirados paulatinamente. El tratamiento de la sobredosis es sintomático. Los síntomas agudos del empleo excesivo de corticoides son por lo general reversibles.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, o acuda a un centro médico, o llame al C.I.A.T.

Presentación de CORTIFAR spray

CORTIFAR spray: Frasco conteniendo 30 ml de solución.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Spefar S.A. Av. Millán 3907 - Montevideo - Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

SC0033 - CORTIFAR SPRAY PROSPECTOS DOBLADOS ND

CÓDIGO	FORMATO	SOPORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
SC0033	95x130	Mayor a 60 g/m ²	19/07/19	19/07/19	130 mm en 5
TINTA: Pantone 654 C					
654 C					
Téc.DG - Marcos Robledo - Consultas: 098144645 - robledo89@gmail.com					

Spefar