



Perifar

FLEX 600

Spedar

Ibuprofeno 600 mg
Orfenadrina 35 mg
Comprimidos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene: Ibuprofeno 600 mg; Orfenadrina citrato 35 mg; Excipientes: Sacarina sódica 0,35 mg; otros c.s.

¿Qué es Perifar FLEX 600 y para qué se utiliza?

Perifar FLEX 600 asocia ibuprofeno, un analgésico anti-inflamatorio no esteroideo (AINE), y citrato de orfenadrina, un relajante muscular de acción central carente de efectos sedantes y de óptima tolerancia. La acción combinada de estos dos compuestos actúa en el círculo vicioso del dolor contractura-dolor-contractura.

Perifar FLEX 600 está indicado en afecciones musculoesqueléticas, síndrome cervicobraquial, tortícolis, dolor interscapular, dorsalgia tensional y ocupacional, lumbalgia, lumbociatalgia, contractura muscular dolorosa de procesos articulares vecinos, lesiones deportivas traumáticas, cefaleas de origen tensional cervical.

No tome este medicamento si:

- Es alérgico a alguno de los principios activos
- Padece úlcera gastroduodenal en actividad o recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados)
- Padece enfermedad inflamatoria intestinal
- Tiene obstrucción pilórica o duodenal
- Padece hipertrofia prostática o estenosis uretral
- Sufre de glaucoma
- Padece Miastenia gravis
- Presenta megaesófago
- Sufre de angioedema o reactividad bronquial al ácido acetilsalicílico u otros AINES
- Presenta hipotonía muscular.
- Tiene insuficiencia renal grave
- Está embarazada o en período de lactancia

Tenga precaución:

- Si tiene edemas
- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene presión arterial alta

- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio
- Si ya está tomando ibuprofeno ya que puede enmascarar la fiebre, que es un signo importante de infección, dificultando su diagnóstico

- Si padece enfermedad renal o hepática, tiene más de 60 años o necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es posible que su médico deba efectuar controles de forma regular

- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej, diarrea grave o vómitos tome abundante líquido y contacte inmediatamente con su médico

- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación gástrica o duodenal (dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro). Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los pacientes de edad avanzada.

- Si tiene problemas de corazón como insuficiencia cardíaca, angina (dolor torácico) o si ha sufrido un ataque al corazón, cirugía de bypass, arteriopatía periférica, o cualquier tipo de ictus (incluido un "mini-ictus" o accidente isquémico transitorio "AIT") o arritmias cardíacas

- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También si utiliza otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los corticoides y los antidepressivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

- Si padece enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa
- Si toma simultáneamente benzodiazepinas y otros depresores del sistema nervioso central

- Si está en tratamiento con diuréticos
- Si padece hipertrofia prostática benigna

- Si padece lupus eritematoso sistémico
- Si padece porfiria intermitente aguda

- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más elevadas del medicamento

Es posible que se produzcan reacciones alérgicas con este medicamento.

Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela. Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivia/controla el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Los pacientes de edad avanzada tienen mayor frecuencia de reacciones adversas a los AINES, especialmente hemorragia y perforación gastrointestinal que pueden ser mortales. Pacientes con demencia o deterioro cognitivo son más susceptibles a los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Los efectos anticolinérgicos de la orfenadrina pueden causar sedación y debilidad.

Los medicamentos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas. No supere la dosis recomendada ni la duración del tratamiento. El ibuprofeno se debe utilizar con precaución cuando se administra a pacientes que padecen o tienen antecedentes de asma bronquial, rinitis crónica o enfermedades alérgicas ya que se ha notificado que ibuprofeno causa broncoespasmo, urticaria o angioedema en dichos pacientes.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. No se recomienda usar **Perifar FLEX 600** durante el embarazo o la lactancia.

6957-02/12/19

PERIFAR FLEX 600 (6957)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	
6957	103x138 mm	Mayor a 60 g/m ²	02/12/2019	11/12/2019	PANTONE 329 C	103 mm en 3	FRENTE

33 36 34
mm mm mm



Conducción y uso de máquinas

Perifar FLEX 600 puede causar maeros o visión borrosa. No conduzca o use máquinas hasta no saber cómo le afecta este medicamento.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Fármacos con acción antimuscarínica como: Amantadina, algunos antihistamínicos, fenotiazinas, antidepressivos tricíclicos

- Anticoagulantes orales Antiagregantes plaquetarios
- Heparina
- Lito
- Uso simultáneo de otros AINEs
- Colestiramina
- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
- Metotrexato
- Mifepristona
- Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos
- Sulfamidas como sulfametoxazol y cotrimoxazol
- Corticoides como cortisona y prednisona,
- Diuréticos
- Pentoxifilina
- Probenecid
- Antibióticos del grupo de las quinolonas como norfloxacino y aminoglucósidos como neomicina
- Sulfpirazona
- Sulfonúreas como tolbutamida (ya que podría producir hipoglucemia)
- Tacrolimus o ciclosporina
- Zidovudina
- Inhibidores de la ECA, betabloqueantes y antagonistas de los receptores de angiotensina II
- Trombolíticos
- Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba
- Inhibidores del CYP2C9 (como por ejemplo voriconazol y fluconazol)
- Benzodiacepinas y otros depresores del sistema nervioso central

Interferencias con pruebas analíticas

La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio:

Tiempo de hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento), concentración de glucosa en sangre (puede disminuir), aclaramiento de creatinina (puede disminuir), hematocrito o hemoglobina (puede disminuir), concentraciones en sangre de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (pueden aumentar), incremento de valores de transaminasas.

Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y si está tomando o ha tomado recientemente ibuprofeno.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Perifar FLEX 600** puede producir efectos no deseados.

Pueden aparecer: náuseas, vómitos, dolor epigástrico, tinnitus, mareos, ansiedad, confusión, insomnio, sequedad de boca, dilatación de pupilas, sequedad de la piel, bradicardia seguida de taquicardia, disminución de la motilidad gastrointestinal que puede llevar a constipación, retención de orina, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, reacciones de hipersensibilidad.

Se han reportado agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia y meningitis aséptica relacionados al uso de Ibuprofeno.

Cómo tomar **Perifar FLEX 600**

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Perifar FLEX 600** indicadas por su médico.

Los comprimidos de **Perifar FLEX 600** deben tomarse con agua.

La dosis recomendada es de 1 comprimido cada 8 horas, dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento. En adultos la dosis máxima diaria de ibuprofeno es de 2,400 mg, (4 comprimidos de **Perifar FLEX 600**)

Población pediátrica
No se recomienda el uso de este medicamento en niños ni en adolescentes.

Pacientes de edad avanzada

Si bien la farmacocinética de ibuprofeno no se altera en los pacientes de edad avanzada, se recomienda emplear la dosis eficaz más baja en estos pacientes.

Insuficiencia renal

En pacientes con disfunción renal leve o moderada debe reducirse la dosis inicial. No se debe utilizar ibuprofeno en pacientes con insuficiencia renal grave

Insuficiencia hepática

Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada deben iniciar el tratamiento con dosis reducidas y ser cuidadosamente vigilados. No se debe utilizar ibuprofeno en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Si toma más **Perifar FLEX 600** del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Presentación de **Perifar FLEX 600**

Envases conteniendo 8 comprimidos recubiertos.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30° C

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C.
Spear S.A. Av Millán 3907 - Montevideo, Industria Uruguaya.

6957-02/12/19

PERIFAR FLEX 600 (6957)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	
6957	103x138 mm	Mayor a 60 g/m ²	02/12/2019	11/12/2019	PANTONE 329 C	103 mm en 3	FRENTE