

Perifar 600

Spefar

RÁPIDA ACCIÓN

Ibuprofeno 600 mg

Cápsulas - Compridos recubiertos

Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada comprimido recubierto o cápsula de **Perifar 600** contiene: Ibuprofeno: 600 mg; Excipientes: c.s.

¿Qué es Perifar 600 y para qué se utiliza?

Perifar 600 contiene ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas debido a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

Perifar 600 está indicado para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad leve a severo de cualquier origen, incluida la migraña, el tratamiento de la artritis, la artritis reumatoide juvenil, artrosis, espondilitis anquilosante, inflamación no reumática y la dismenorrea primaria.

No tome este medicamento si:

- es alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento
- padece enfermedad hepática, renal, o insuficiencia cardíaca graves
- ha tenido una úlcera o hemorragia gástrica o duodenal o ha sufrido una perforación del aparato digestivo
- ha presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos
- padece o ha padecido asma, rinitis o urticaria
- presenta vómitos de sangre, heces negras, o diarrea con sangre
- padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación, o está tomando anticoagulantes
- se encuentra en el tercer trimestre del embarazo

Tenga precaución:

Informe a su médico si:

- tiene edemas
- tiene o ha tenido algún trastorno del corazón (insuficiencia cardíaca, angina, antecedentes de infarto agudo de miocardio, cirugía de bypass), hipertensión arterial, arteriopatía periférica, o cualquier tipo de ictus (incluido accidente isquémico transitorio "AIT"), diabetes, colesterol alto, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o ictus, o si es fumador

Los AINEs se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas.

- sufre de asma o cualquier otro trastorno respiratorio
- está recibiendo tratamiento con **Perifar 600** ya que puede enmascarar la fiebre, que es un signo importante de infección, dificultando su diagnóstico
- padece enfermedad renal o hepática, tiene más de 60 años o necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas)
- presenta riesgo de deshidratación (p.ej. diarrea grave o vómitos), tome abundante líquido y contacte inmediatamente a su médico,

ya que el ibuprofeno en este caso concreto podría provocar una insuficiencia renal como consecuencia de la deshidratación

- ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación gástrica o duodenal, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro (este riesgo es mayor con: dosis altas, tratamientos prolongados, antecedentes de úlcera péptica, pacientes de edad avanzada. En estos casos el médico considerará asociar un medicamento protector del estómago)

- toma medicamentos que alteran la coagulación de la sangre (anticoagulantes, antiagregantes)

- usa otros medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hemorragia (corticoides, antidepresivos ISRS)

- padece enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (**Perifar 600** puede empeorar estas patologías)

- está en tratamiento con diuréticos (su médico debe vigilar el funcionamiento de su riñón)

- padece lupus eritematoso sistémico, ya que puede producirse meningitis aséptica

- padece porfiria intermitente aguda (se debe valorar la conveniencia del tratamiento con ibuprofeno)

Durante el tratamiento a largo plazo con dosis elevadas de analgésicos, pueden producirse dolores de cabeza que no deben tratarse con dosis más elevadas del medicamento

El médico efectuará un control más estricto si recibe ibuprofeno tras ser sometido a cirugía mayor.

Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela.

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controlé el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Embarazo, lactancia y mujeres en edad fértil

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

No se recomienda el uso de **Perifar 600** durante el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre el uso de **Perifar 600** está contraindicado.

Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo **Perifar 600** se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

Se desaconseja tomar ibuprofeno por periodos prolongados durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Si solamente toma una dosis de ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario que adopte precauciones especiales.

Si experimenta mareo, vértigo, alteraciones de la visión u otros síntomas mientras está tomando este medicamento, no debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Perifar 600 puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. Por ejemplo:

- Otros AINEs; Antiagregantes plaquetarios como ticlodipina; Medicamentos anticoagulantes (p. ej. ácido acetilsalicílico, warfarina); Medicamentos antihipertensivos (IECA como captopril, betabloqueantes como atenolol, y antagonistas de los receptores de angiotensina-II como losartán); Litio; Metotrexato; Mifepristona; Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos; Hidantoinas como fenitoína; Sulfamidas como sulfametoxazol y cotrimoxazol; Corticoides como cortisona y prednisona; Diuréticos; Pentoxifilina; Probenecid; Antibióticos quinolonas como el norfloxacino, y aminoglucósidos como la neomicina; Sulfipirazona; Sulfonilureas como tolbutamida; Tacrolimus; Ciclosporina; Zidovudina; Trombolíticos; Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba

Otros medicamentos también pueden afectar o ser afectados por el tratamiento con **Perifar 600**. Por tanto, debe consultar siempre a su médico antes de utilizar **Perifar 600** con otros medicamentos. Interferencias con pruebas analíticas

La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio: Tiempo de hemorragia (puede prolongarse); Glicemia (puede disminuir); Aclaramiento de creatinina (puede disminuir);

6519-04/06/19

6519

Spefar

hM Digital

6519 Perifar 600 Rápida Acción

FORMATO

103x138

SOPORTE

Mayor a 60 g/m²

ACTUALIZACIÓN


04/06/19

APROBACIÓN

04/06/19

PLEGADO

103 mm en 3 según esquema



1 Tinta Pantone

192 C



Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir); Concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (puede aumentar); Incremento de valores de transaminasas hepáticas. Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y está tomando o ha tomado recientemente ibuprofeno.

Toma de Perifar 600 con los alimentos y bebidas

Puede tomarlo solo o con los alimentos. En general se recomienda tomarlo durante las comidas o con leche para reducir así la posibilidad de que se produzcan molestias en el estómago.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Perifar 600** puede producir efectos no deseados. Los efectos adversos son más comunes en personas mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.

Gastrointestinales: Los efectos adversos que más frecuentemente ocurren son los gastrointestinales: úlceras pépticas, hemorragias digestivas, perforaciones, especialmente en los pacientes de edad avanzada. También se han observado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, ardor de estómago, dolor abdominal, sangre en heces, aftas bucales, empeoramiento de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Menos frecuentes: gastritis, Peco frecuentes: gingivitis con formación de úlceras. Raros: infesofagitis, estenosis esofágica, diverticulitis, colitis hemorrágica inespecífica (gastroenteritis que cursa con diarrea con sangre). Muy raros: pancreatitis.

Cardiovasculares: puede asociarse a un moderado aumento de riesgo de sufrir infarto de miocardio o cerebral. También se han observado edema, hipertensión arterial, e insuficiencia cardíaca. Cutáneos: Muy raros: Síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Frecuentes: erupción. Poco frecuentes: enrojecimiento, picazón o hinchazón de la piel, púrpura (manchas violáceas). Muy raros: caída del cabello, eritema multiforme, fotosensibilidad, inflamación de los vasos sanguíneos de la piel. Excepcionalmente: infecciones cutáneas graves y complicaciones en el tejido blando durante la varicela.

Sistema inmunológico: Poco frecuentes: edema pasajero en áreas de la piel, mucosas o a veces en vísceras (angioedema), inflamación de la mucosa nasal, broncoespasmo. Raros: reacciones alérgicas graves (shock anafiláctico). Muy raros: dolor en las articulaciones y fiebre (lupus eritematoso).

Sistema nervioso central: Frecuentes: fatiga o somnolencia, dolor de cabeza y mareos o sensación de inestabilidad. Raros: parestesia (sensación de adormecimiento, hormigueo, acorchamiento). Muy raros: meningitis aséptica.

Psiquiátricos: Poco frecuentes: insomnio, ansiedad, inquietud. Raros: desorientación o confusión, nerviosismo, irritabilidad, depresión, reacción psicótica.

Auditivos: Frecuentes: vértigo. Poco frecuentes: zumbidos o pitidos en los oídos. Raros: hipoacusia.

Oculares: Poco frecuentes: alteraciones de la visión. Raros: visión anormal o borrosa.

Sanguíneos: Raros: disminución de plaquetas, disminución de los glóbulos blancos, disminución de los glóbulos rojos, disminución de granulocitos y agranulocitosis, pancitopenia (deficiencia de glóbulos rojos, blancos y plaquetas), anemia aplásica o anemia hemolítica. Muy raros: aumento del tiempo de sangrado. Renales: En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia renal.

Hepáticos: en raras ocasiones se asocia a lesiones hepáticas. Raros: hepatitis, anomalías de la función hepática e ictericia. Frecuencia desconocida: insuficiencia hepática.

Generales: Agravación de las inflamaciones durante procesos infecciosos.

Si aparece alguno de los efectos adversos citados a continuación, interrumpa el tratamiento y acuda de inmediato a su médico: Reacciones alérgicas tales como erupciones en la piel, hinchazón de la cara, silbidos en el pecho o dificultad respiratoria; Vómitos de sangre, o de aspecto similar a la bolla de café; Sangre en

las heces o diarrea con sangre; Dolor intenso de estómago; Ampollas o descamación de la piel; Dolor de cabeza intenso o persistente; Coloración amarilla de la piel (ictericia); Signos de hipersensibilidad (alergia) grave; Hinchazón de las extremidades o edema de brazos o piernas.

Cómo tomar Perifar 600

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Perifar 600** indicadas por el médico. El médico le indicará la dosis y duración del tratamiento.

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controlé el dolor y no debe tomar **Perifar 600** más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Este medicamento se administra por vía oral. Los comprimidos y cápsulas de **Perifar 600** deben tomarse con agua. Los pacientes con molestias de estómago deben tomar el medicamento con leche o durante las comidas.

Adultos y adolescentes desde 14 a 18 años: un comprimido (600 mg) cada 6 a 8 horas. Dosis máxima diaria: 2400 mg en adultos y 1600 mg en adolescentes de 12 a 18 años.

Niños y adolescentes menores de 14 años: No se recomienda el uso de este medicamento ya que la dosis de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes.

Mayores de 60 años: es posible que el médico recete una dosis más baja de lo habitual.

Pacientes con enfermedad renal y/o hepática: es posible que el médico le recete una dosis más baja de lo habitual. Si es así, tome la dosis exacta que éste le haya prescrito.

Si toma más Perifar 600 del que debiera

Si ha tomado más **Perifar 600** de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del envase, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Los síntomas de sobredosis son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, indiferencia, sueño, dolor de cabeza, movimientos involuntarios rápidos del ojo, zumbido de oídos y falta de coordinación. Es raro que aparezcan síntomas más graves como hemorragia intestinal, bajada de la presión, bajada de la temperatura corporal, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de la función renal, coma, síndrome disneico agudo del adulto y parada transitoria de la respiración en niños (después de ingerir grandes cantidades).

En caso de ingestión de cantidades importantes deberá administrarse carbón activado. El vaciado gástrico se planteará si ha ingerido cantidades importantes y durante los 60 minutos siguientes a la ingestión.

Presentación de Perifar 600

Envases conteniendo: 8 comprimidos recubiertos.

Envases conteniendo: 10 cápsulas blandas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro. Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30° C

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.

Mantener alejado del alcance de los niños. Conservar entre 15° C y 30° C, en lugar seco. **Spefar S.A.** Av Millán 3907 – Montevideo Industria Uruguaya.

6519-04/06/19

6519

hM Digital

6519 Perifar 600 Rápida Acción

FORMATO	SOPORTE	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	PLEGADO
103x138	Mayor a 60 g/m ²	04/06/19	04/06/19	103 mm en 3 según esquema

1 Tinta Pantone

192 C

34 mm36 mm33 mm

DORSO

DPTO. DE DISEÑO - Consultas técnicas; (00598) 2705 7219 / hmdigital@hmcreativos.com