

# Lordex

Spifar

## Loratadina 10 mg - Dexametasona 2 mg Comprimidos recubiertos Vía oral

### Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si necesita consejo o más información, consulte a su médico. Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar al médico. Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

### Fórmula

Cada comprimido recubierto de **Lordex** contiene: Loratadina 10 mg, Dexametasona 2 mg; Excipientes: Lactosa 100 mg, otros c.s.

### ¿Qué es Lordex y para qué se utiliza?

Lordex brinda una acción antialérgica inmediata, potente y mantenida durante 24 hs, proporcionada por la asociación de dos principios terapéuticos.

Loratadina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos. Loratadina ayuda a reducir sus síntomas de alergia, bloqueando los efectos de una sustancia llamada "histamina", que se produce en el organismo cuando se es alérgico a algo.

Dexametasona es un glucocorticoide sintético. Los glucocorticoides son hormonas producidas por la corteza de las glándulas adrenales. Este medicamento tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y antialérgicos, y suprime el sistema inmune.

Lordex está indicado para el tratamiento sintomático de cuadros alérgicos como rinitis alérgica (estornudos, goteo o picor nasal y escozor o picor en los ojos), conjuntivitis aguda, rinoфаринgitis, laringotraqueobronquitis, alergia a alimentos, en adultos y niños mayores de 6 años, que pesen más de 30 kg. También se puede utilizar para ayudar a aliviar los síntomas de la urticaria (tales como picor, enrojecimiento y el número y el tamaño de las ronchas cutáneas), rinitis perenne, dermatitis y eczema de contacto.

### No tome este medicamento si:

- Es alérgico (hipersensible) a la Loratadina, Dexametasona, o a alguno de los demás componentes.
- Sufre una infección que afecta al cuerpo entero (a menos que esté recibiendo tratamiento).
- Tiene una úlcera de estómago o duodenal.
- Va a ser vacunado con vacunas vivas.
- Niños menores de 12 años.

### Tenga precaución:

Antes de iniciar el tratamiento con Lordex, informe a su médico si:

- si tiene problemas del riñón o del hígado (cirrosis hepática o fallo renal grave).
- si tiene un tumor en la glándula adrenal (feocromocitoma).
- si tiene la presión sanguínea alta, problemas de corazón o si ha sufrido recientemente un ataque al corazón (se ha comunicado ruptura del miocardio).
- si tiene diabetes o antecedentes familiares de diabetes.
- si tiene osteoporosis (debilitamiento de los huesos), particularmente si es una mujer que haya pasado la menopausia.
- si ha padecido debilidad muscular con éste u otros esteroides en el pasado.

- si tiene glaucoma (presión ocular elevada) o antecedentes familiares de glaucoma, cataratas (opacidad del cristalino del ojo que produce disminución de visión).
- si tiene miastenia gravis (una enfermedad que causa debilidad muscular).
- si tiene un problema intestinal o úlcera de estómago (péptica).
- si tiene problemas psiquiátricos o ha tenido trastornos psiquiátricos que hayan sido empeorados por este tipo de medicamento.
- si tiene epilepsia (enfermedad en la que sufre convulsiones o ataques repetidos).
- si sufre migraña.
- si tiene la glándula tiroidea poco activa.
- si tiene una infección parasitaria.
- si tiene tuberculosis, septicemia o infección fúngica en el ojo.
- si sufre malaria cerebral.
- si tiene herpes (úlceras bucales o herpes genital y herpes ocular simple debido a una posible perforación corneal).
- si tiene asma.
- si está tratado por obstrucción de los vasos sanguíneos por coágulos de sangre (tromboembolismo).
- si sufre ulceraciones corneales y daño corneal.
- si se le va a efectuar cualquier tipo de prueba cutánea para la alergia. No tome loratadina durante los 2 días previos a la realización de dichas pruebas, porque este medicamento puede alterar los resultados de las mismas.

Si alguna vez ha tenido una depresión grave o depresión maníaca (trastorno bipolar). Esto incluye haber tenido una depresión antes o mientras se está tomando medicamentos esteroides como dexametasona.

El tratamiento con corticosteroides puede reducir la capacidad de su cuerpo para hacer frente a infecciones. Esto puede derivar algunas veces en infecciones causadas por gérmenes, que raramente causan infección en circunstancias normales (llamadas infecciones oportunistas). Si padece una infección de cualquier tipo durante el tratamiento con este medicamento, contacte con su médico inmediatamente.

### Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No se recomienda su uso si está embarazada o en período de lactancia.

### Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, no se espera que Lordex produzca somnolencia o disminución del estado de alerta. Sin embargo, en muy raras ocasiones algunas personas experimentan confusión, alucinaciones, mareos, cansancio, sueño, desmayo o visión borrosa, que puede afectar a su capacidad de conducir o utilizar máquinas.

### Información importante sobre algunos de los componentes de Lordex

Lordex contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

Los efectos secundarios de Lordex pueden aumentar cuando se utiliza junto con medicamentos que alteran el rendimiento de algunas enzimas que se encuentran en el hígado (CYP3A4 y CYP2D6 del citocromo P450) como Cimetidina, Eritromicina, Ketoconazol, Quinidina, Fluconazol, y Fluoxetina; o si su hígado no está funcionando bien.

### Informe a su médico o farmacéutico si está tomando:


- Medicamentos anticoagulantes que diluyen la sangre (p.ej. warfarina)

6906-06/09/19

6906 LORDEX

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	FRENTE
6906	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	06 / 09 / 2019	06 / 09 / 2019	PANTONE 654 C	103 mm en 3	

33 36 34  
mm mm mm



- Ácido acetilsalicílico o similar (antinflamatorios no esteroideos) p.ej., indometacina
- Medicamentos usados para tratar la diabetes
- Medicamentos usados para tratar la presión sanguínea elevada
- Medicamentos usados para tratar los problemas cardíacos
- Diuréticos
- Inyección de antiferitina B
- Fenitoína, carbamazepina, primidona (medicamentos para la epilepsia)
- Rifabutina, rifampicina, isoniazida (antibióticos usados para tratar la tuberculosis)
- Anticídicos – particularmente aquellos que contengan trisilicato de magnesio
- Barbitúricos (medicamentos usados para ayudar a dormir y aliviar la ansiedad)
- Aminoglutetimida (tratamiento anticanceroso)
- Carbenoxolona (usado en el tratamiento de úlceras de estómago)
- Efedrina (descongestionante nasal)
- Acetazolamida (usado para el glaucoma y epilepsia)
- Hidrocortisona, cortisona y otros corticosteroides
- Ketoconazol, itraconazol (para infecciones fúngicas)
- Ritonavir (para el VIH)
- Antibióticos incluyendo eritromicina, fluorquinolonas
- Medicamentos que ayudan al movimiento muscular en pacientes con miastenia gravis (p.ej., neostigmina)
- Colestiramina (para niveles altos de colesterol)
- Hormonas estrogénicas incluyendo píldora anticonceptiva
- Tetracosactida usada en los test de función adrenocortical
- Sultoprida usada para calmar emociones
- Ciclosporina usada para prevenir el rechazo tras trasplantes
- Talidomida usada p. ej., para el mieloma múltiple
- Praziquantel administrada para ciertas infecciones por lombrices
- Vacunación con vacunas vivas
- Cloroquinina, hidroxiquinina y mefloquina (para la malaria)
- Somatotropina
- Protirelina

#### Toma de Lordex con los alimentos y bebidas

Lordex se debe tomar junto con o después de la comida para minimizar la irritación del tracto gastrointestinal. Se deben evitar las bebidas que contengan alcohol o cafeína. Se recomienda tomar comidas pequeñas y frecuentes, así como la posibilidad de tomar anticídicos, si se lo recomienda su médico.

#### Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Lordex puede producir efectos no deseados.

Consulte a su médico inmediatamente si experimenta problemas mentales graves. Estos pueden afectar a 5 de cada 100 personas que tomen medicamentos como dexametasona. Estos problemas incluyen:

- sentirse deprimido, incluyendo pensamientos suicidas
- sentirse con mucha euforia (mania) o estados de ánimo que suben y bajan
- sentir ansiedad, tener problemas de sueño, dificultad para pensar o estar confuso y pérdida de memoria
- sentir, ver u oír cosas que no existen. Tener pensamientos extraños o aterradores, cambiar su manera de actuar o sentirse solo.

Los efectos adversos comunicados más frecuentes incluyen: somnolencia, dolor de cabeza, aumento del apetito, dificultad para dormir, nerviosismo, cansancio.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes): reacción alérgica grave (incluyendo hinchazón), mareo, convulsiones, latidos cardíacos irregulares o rápidos, náuseas (ganas de vomitar), sequedad de boca, malestar de estómago, problemas de ingado, pérdida del cabello, erupción cutánea.

Frecuencia no conocida: Aumento de peso.

No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

#### Cómo tomar Lordex

Siga exactamente las instrucciones de administración de Lordex indicadas por su médico.

Adultos y niños mayores de 12 años:

Tome 1 comprimido 1 vez al día con un vaso de agua. Se recomienda tomar en la mañana, preferiblemente en ayunas.

Uso en niños

Es importante que su médico vigile su crecimiento y desarrollo a intervalos frecuentes. Lordex no debe utilizarse de forma rutinaria en niños prematuros con problemas respiratorios.

Adultos con problemas graves de hígado que pesen más de 30 kg, tome 1 comprimido 1 vez al día y en días alternos con un vaso de agua, con o sin alimento.

#### Si olvidó tomar Lordex

Es importante tomar Lordex como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### Si toma más Lordex del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

No son de esperar problemas graves, sin embargo, puede tener dolor de cabeza, palpitaciones o sentir somnolencia.

#### Presentación de Lordex

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir en dosis iguales.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

#### Producto medicinal

Mantener alejado del alcance de los niños  
Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C, lugar seco.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o escribanos a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Venta bajo receta profesional.

#### Spefar S.A.

Av. Millán 3907  
Montevideo - Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios  
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

6906-06/09/19

#### 6906 LORDEX

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	34 mm	36 mm	33 mm
6906	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	06 / 09 / 2019	06 / 09 / 2019	PANTONE 654 C	103 mm en 3			

DORSO