

Perifar

DESCONGESTIVO

IBUPROFENO 200 mg
+FENILEFRINA CLORHIDRATO 10 mg
+CLORFENIRAMINA MALEATO 4 mg
 Comprimidos recubiertos
 Vía oral

Spesar

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
 Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
 Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.
 Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.
 Si la fiebre se mantiene durante más de 3 días de tratamiento, el dolor o los otros síntomas persisten más de 5 días, o bien empeora o aparecen otros síntomas nuevos, deberá consultar al médico.

Fórmula
 Cada comprimido recubierto contiene:
 ibuprofeno 200 mg, Fenilefrina clorhidrato 10 mg, Clorfeniramina maleato 4 mg;
 Contiene Lactosa.

¿Qué es Perifar DESCONGESTIVO y para qué se utiliza?
Perifar DESCONGESTIVO contiene ibuprofeno, clorfeniramina y fenilefrina. El ibuprofeno es un antiinflamatorio y analgésico que reduce la inflamación, el dolor y la fiebre.
 La clorfeniramina es un antihistamínico que alivia la secreción nasal.
 La fenilefrina es un simpaticomimético que reduce la congestión nasal.

Perifar DESCONGESTIVO está indicado en adultos y niños a partir de 12 años para el alivio de los síntomas de los catarros y gripes que cursan con fiebre o dolor leve o moderado, congestión y secreción nasal.

No tome este medicamento si:

- es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento
- ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo
- ha presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, aspirina u otros analgésicos
- padece o ha padecido asma, rinitis y urticaria
- padece una enfermedad grave del hígado, del riñón, corazón o en las arterias
- padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea
- vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre
- padece hipertensión arterial
- padece hipertirodismo
- padece diabetes mellitus
- padece taquicardias
- está en tratamiento con algún medicamento inhibidor de la monoaminooxidasa (MAO) (como pueden ser algunos medicamentos antidepresivos, o medicamentos para la enfermedad de Parkinson)
- está en tratamiento con medicamentos simpaticomiméticos (medicamentos utilizados para el tratamiento del asma, o medicamentos para acelerar la frecuencia de los latidos del corazón)
- está en tratamiento con medicamentos betabloqueantes
- padece glaucoma
- se encuentra en el tercer trimestre del embarazo
- es menor de 12 años

Tenga precaución:

- Si durante el tratamiento con este medicamento nota dolor abdominal intenso o persistente y/o heces de color negro, suspenda la toma de este medicamento y consulte inmediatamente con su médico, porque puede ser que se le haya producido una hemorragia o perforación en el estómago o en

el duodeno. Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes que hayan padecido con anterioridad de úlcera péptica y en personas de edad avanzada.

- Medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como el ibuprofeno pueden asociarse con un pequeño aumento del riesgo de ataque al corazón o un derrame cerebral, especialmente cuando se usa en dosis altas. No exceda la dosis o la duración del tratamiento recomendado.
- No debe tomar más de 3 comprimidos al día (1200 mg de ibuprofeno al día), para evitar la posible aparición de problemas circulatorios o de corazón.

Consultar al médico antes de tomar este medicamento, especialmente:

- Si ha sufrido enfermedades del estómago o del intestino (ej. úlcera), en cuyo caso no debería consumir este medicamento sin supervisión médica. El dolor de estómago o intestinal no debe tratarse con este medicamento.
- Si al tomar el medicamento nota ardor o dolor de estómago, debe suspender el tratamiento y consultar a su médico.
- Tiene problemas de corazón, incluyendo insuficiencia cardíaca, angina (dolor de pecho), o si ha tenido un ataque al corazón, cirugía de bypass, la enfermedad arterial, o cualquier tipo de accidente cerebrovascular (incluyendo "mini-accidente cerebrovascular" o ataque isquémico transitorio "AIT")
- Si tiene la presión alta, diabetes, colesterol alto, es fumador, o tiene un historial familiar de enfermedad cardíaca o un derrame cerebral.
- Si sufre otra enfermedad o padece algún tipo de alergia
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa debido a que los medicamentos con ibuprofeno pueden empeorar estas enfermedades.
- Si padece hipertensión, enfermedades del riñón, del hígado o del corazón, alteraciones en la coagulación sanguínea o está en tratamiento con anticoagulantes, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.
- Si padece varicela no deberá tomar ibuprofeno
- En caso de deshidratación, por diarrea grave o vómitos, especialmente en niños, tome abundante líquido y acuda inmediatamente al médico.
- Si padece porfiria intermitente aguda.
- Los pacientes con enfermedades del riñón, del hígado, del corazón o del pulmón, consulte a los pacientes con anemia.
- Los pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico.
- Los pacientes sensibles (alérgicos) a un antihistamínico, porque pueden ser sensibles a otros antihistamínicos (como es clorfeniramina).
- Los pacientes que están en tratamiento con medicamentos para tratar: hiperтроfia de próstata, asma bronquial, latidos del corazón muy lentos, hipotensión, arteriosclerosis cerebral, inflamación del páncreas (pancreatitis), úlcera digestiva (úlcera péptica estenosante), obstrucción piloroduodenal (entre el estómago y el intestino), enfermedades del tiroides, pacientes sensibles a los efectos sedantes de algunos medicamentos.
- Si está en tratamiento con antidepresivos tricíclicos o medicamentos con efecto similar, debe dejar de tomar este medicamento y consultar inmediatamente a un médico, porque se le podría producir íleo paralítico (detección de los movimientos normales de una parte del intestino).

Niños y adolescentes
 Los niños menores de 12 años no deben tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia
 Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
 Debe evitarse el uso de ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre del embarazo. No deberá utilizarse en el último trimestre de embarazo.
 Este medicamento no se puede utilizar durante el periodo de lactancia, porque puede producir efectos adversos en el bebé.

Conducción y uso de máquinas
 Este medicamento puede producir somnolencia alterando la capacidad mental y/o física. Si nota estos efectos, evite conducir vehículos o utilizar máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de Perifar DESCONGESTIVO
Perifar DESCONGESTIVO contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Uso de otros medicamentos
 Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.
 En particular, si está tomando algunos de los siguientes medicamentos, ya que puede ser necesario modificar la dosis de algunos de ellos o la interrupción del tratamiento:

- Anticoagulantes orales (por ejemplo, ácido acetilsalicílico/ácido acetil salicílico, warfarina, acenocumarol, ticoprida)
- Baclofeno
- Antihipertensivos (inhibidores de la ECA como captopril, beta-bloqueadores como atenolol), medicamentos antagonistas de los receptores de angiotensina II como losartán)
- Ciclosporina y tacrolimus
- Digoxina y antiarrítmicos
- Antiépilepticos (lamotrigina, fenitoína u otras hidantoinas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamazepina)


1016190840-07/08/20

PERIFAR DESCONGESTIVO (1016190840)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	33 mm	36 mm	34 mm
1016190840	103x138 mm	Mayor a 60 g/m ²	07/08/2020	07/08/2020	PANTONE 4625 C	103 mm en 3			

33 mm 36 mm 34 mm

FRENTE



- Diuréticos (furosemida, u otros diuréticos), y otros diuréticos que producen pérdida de potasio (como diuréticos para tratar la hipertensión u otros)
- Insulina e hipoglucemiantes orales
- Lito
- Metotrexato
- Mifepristona
- Pentoxifilina
- Probenecid
- Antibióticos del grupo de las Quinolonas y de las Sulfamidas
- Resinas de intercambio iónico como colestiramina
- Sulfipirazona
- Tacina
- Trombolíticos
- Zidovudina
- Isoniazida, rifampicina
- Barbitúricos
- Metoclopramida y domperidona
- Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). Se debe separar la administración de **Perifar DESCONGESTIVO** un mínimo de 15 días después de terminar el tratamiento.
- Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos
- Bloqueantes alfa-adrenérgicos
- Bloqueantes alfa y beta-adrenérgicos (como labetalol y carvedilol)
- Medicamentos anestésicos generales
- Medicamentos que contienen hormonas tiroideas
- Atropina sulfato
- Medicamentos depresores del sistema nervioso central (como los hipnóticos y ansiolíticos)
- No se debe utilizar con otros medicamentos analgésicos y antiinflamatorios (antinflamatorios no esteroideos y corticoides) que disminuyen el dolor y la inflamación, en caso así al médico.

Interferencias con pruebas analíticas

Si le van a hacer alguna prueba analítica (incluido análisis de sangre, orina, etc.) comunique a su médico que está tomando/usando este medicamento, ya que puede alterar los resultados.

Toma de **Perifar DESCONGESTIVO** con los alimentos y bebidas

La toma de este medicamento con alimentos no afecta la eficacia del mismo. Mientras esté en tratamiento con este medicamento no debe tomar alcohol, ya que el alcohol aumenta la posibilidad de que se produzcan efectos adversos gastrointestinales producidos por ibuprofeno. Además el alcohol puede potenciar la irritación crónica producida por ibuprofeno y también potencia el efecto sedante producido por la clorfeniramina.

Si usted consume habitualmente alcohol (3 o más bebidas alcohólicas = cerveza, vino, licor... - al día), tomar **Perifar DESCONGESTIVO** le puede provocar una hemorragia de estómago.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Perifar DESCONGESTIVO** puede producir efectos no deseados. Durante el periodo de uso con cada uno de los fármacos que se encuentran en la asociación de **Perifar DESCONGESTIVO**, se han comunicado los siguientes efectos adversos, cuya frecuencia no se ha establecido con exactitud:

- **Frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas):** Cansancio, dolor de cabeza, ardor y dolor de estómago, trastornos de la piel (erupciones cutáneas, picazón), zumbidos de oídos, ligera somnolencia, mareo, debilidad muscular, estos efectos adversos pueden desaparecer tras 2-3 días de tratamiento. Sequedad de boca nariz y garganta, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y espesamiento de las mucosidades.

- **Poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas):** Reacciones alérgicas, asma, rinitis y urticaria (ronchas en la piel y picor intenso), dificultad en los movimientos de la cara, torpeza, temblor, alteraciones en las sensaciones y hormigueos, pérdida de apetito, alteraciones del gusto o del olfato, hemorragias y úlceras gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión borrosa, disminución de la agudeza visual o cambios en la percepción del color, alteraciones auditivas y alteración de la coagulación cuando se toman dosis altas.

- **Raros (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):** Edema (hinchazón por retención de líquidos), alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación de estómago e intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y los ojos), alteraciones del riñón consistente en: nefritis aguda intersticial con hematuria (sangre en orina), proteinuria (eliminación de proteínas por la orina) y ocasionalmente síndrome nefrótico; depresión, trastornos de la visión (oscurecimiento de la visión), rigidez de cuello y broncoespasmos, disnea (dificultad para respirar) y angioedema (inflamación de las capas profundas de la piel, que cursa con hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, pudiendo causar dificultad al tragar o respirar). Mareo, bajada de la presión arterial (hipotensión) Irrianto de miocardio, arritmia ventricular, edema pulmonar (aumento del volumen de líquido en los pulmones) y hemorragia cerebral (a dosis elevadas o en pacientes sensibles).

Excitación nerviosa (generalmente con dosis altas, y más frecuente en ancianos y niños), que puede incluir síntomas como: inquietud, insomnio, nerviosismo e incluso convulsiones.

Otros efectos adversos que pueden aparecer con poca frecuencia son: latidos rápidos o irregulares del corazón (generalmente con sobredosis), sensibilidad cruzada (alergia) con medicamentos relacionados con la clorfeniramina. Bajada o subida de presión arterial.

- **Muy raras (puede afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):** Meningitis aséptica, alteraciones de la sangre (anemia aplásica y anemia hemolítica) y de la coagulación, hipotensión e insuficiencia cardíaca, alteraciones graves de la piel (eritema cutáneo), y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson (afectación grave de la piel) y la necrólisis epidérmica tóxica (lesiones en la piel y mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme (inflamación de la piel) e hipoglucemia (bajada de azúcar en sangre).

- **Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles):** Ansiedad, iritabilidad, debilidad, hipertensión arterial (generalmente con dosis elevadas y en pacientes sensibles), dolor de cabeza (con dosis altas y puede ser un síntoma de hipertensión), latidos del corazón muy lentos (bradicardia grave), vasoconstricción periférica, reducción del rendimiento del corazón que afecta especialmente a ancianos y pacientes con pobre circulación cerebral o coronaria, posible producción o agravamiento de una enfermedad cardíaca, retención urinaria, palidez, vello erizado, subida de azúcar en sangre (hiperglucemia), bajada de potasio en la sangre, acidosis metabólica, frío en las extremidades (manos o brazos), rubor, sensación de desmayo (hipotensión). Con dosis elevadas se pueden producir: vómitos, palpitaciones, estados psicóticos con alucinaciones; en uso prolongado se puede producir disminución del volumen de sangre. Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como síndrome DRESS. Los síntomas del síndrome DRESS incluyen: erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y eosinofilia elevados (un tipo de glóbulos blancos).

Cómo tomar **Perifar DESCONGESTIVO**

Si no está familiarizado las instrucciones de administración de **Perifar DESCONGESTIVO** indicadas por su médico.

No se recomienda tomar con el estómago vacío. Tome **Perifar DESCONGESTIVO** después de las comidas o con algún alimento o con leche (especialmente si se notan molestias digestivas).

Tomar siempre la dosis menor que sea efectiva. La toma de este medicamento está supeditada a la aparición de los síntomas. A medida que éstos desaparezcan debe suspender el tratamiento.

Adultos y niños a partir de 12 años

1 comprimido cada 6-8 horas según necesidad. No se pueden tomar más de 6 comprimidos en 24 horas y se debe dejar un tiempo mínimo entre cada toma de 6 horas.

Pacientes con enfermedades del riñón, del hígado o del corazón

Reducir la dosis y consultar al médico.

Utilizar siempre la menor dosis que sea efectiva.

Uso en pacientes de edad avanzada

Las personas de edad avanzada no pueden utilizar este medicamento sin consultar al médico porque les pueden afectar especialmente algunos efectos adversos del medicamento como la aparición de latidos lentos del corazón (bradicardia) o la reducción del caudal cardíaco, por el contenido de fenilfrina y clorfeniramina. También es más probable que puedan presentar efectos adversos como sedación, confusión, hipotensión o excitación, y pueden ser más sensibles a efectos como sequedad de boca y retención urinaria.

Si toma más **Perifar DESCONGESTIVO** del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Los síntomas por sobredosis pueden incluir náuseas, dolor de estómago, vómitos (que pueden contener espumas con sangre), dolor de cabeza, zumbido en los oídos, confusión y movimiento involuntario de los ojos. A dosis elevadas se han notificado síntomas de somnolencia, dolor en el pecho, palpitaciones, pérdida de conciencia, convulsiones (principalmente en niños), debilidad y mareo, sangre en la orina, espasmos y problemas para respirar.

Otros síntomas de la sobredosis son: vértigos, visión borrosa, sudoración, bajada o elevación de la presión arterial, alteración del pulso (arritmias cardíacas), nerviosismo, alucinaciones, espasmos, y ocasionalmente diarrea.

Presentación de **Perifar DESCONGESTIVO**

Envases conteniendo 8 y 10 comprimidos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a

www.cimlatam.com o escribanos a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Control médico recomendado.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.

Syfar S.A. Av. Milán 2907 - Montevideo, Industria Liguayua

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios

0800-3000. L a V. de 9 a 17 hs.

1016190840-07/08/20

PERIFAR DESCONGESTIVO (1016190840)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO	34 36 33 mm mm mm
1016190840	103x138 mm	Mayor a 60 g/m ²	07/08/2020	07/08/2020	PANTONE 4625 C	103 mm en 3	FRENTE