

# Coral

Drosipirenona 3 mg  
Etinilestradiol 30 mcg

## Vía oral Comprimidos recubiertos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conservar esta prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.  
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.  
Si tiene alguna duda o si cree que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

**Causa importante que debe saber acerca de los anticonceptivos hormonales combinados (AHCa):**  
Son uno de los métodos anticonceptivos reversibles más fiables si se utilizan correctamente.

• Aumentan ligeramente el riesgo de sufrir un coágulo de sangre en las venas y arterias, especialmente en el primer año o cuando se renicia el uso de un anticonceptivo hormonal combinado tras una pausa de 4 semanas o más.  
• Está alerta y consulte a su médico si cree que puede tener síntomas de un coágulo de sangre.

**Forma**  
**Composición de los comprimidos**

- 21 comprimidos de color amarillo. Etinilestradiol 0,03 mg, Drosipirenona 3 mg.  
- 7 comprimidos inactivos blancos. Estos comprimidos no contienen principios activos. Contienen lactosa.

**¿Qué es Coral y para qué se utiliza?**  
Coral es un anticonceptivo y se utiliza para evitar el embarazo.

Cada uno de los 21 comprimidos amarillos, contiene una pequeña cantidad de dos hormonas femeninas diferentes, denominadas drosipirenona y etinilestradiol. Los 7 comprimidos blancos no contienen principios activos y también se denominan comprimidos blancos. Los anticonceptivos que contienen dos hormonas se denominan anticonceptivos combinados.

**Consideraciones generales**  
Antes de empezar a tomar Coral debe leer la información acerca de los coágulos de sangre en el ítem "Contraindicaciones". Es particularmente importante que lea los síntomas de un coágulo de sangre.

Antes de empezar a tomar Coral, su médico le hará algunas preguntas sobre su historia clínica personal y familiar. El médico también medirá su presión arterial, y dependiendo de su situación personal, podrá llevar a cabo algunas otras pruebas.  
En este prospecto se describen varias situaciones en las que usted debería de interrumpir el uso de Coral, o en las que la fiabilidad de Coral puede disminuir. En dichas situaciones, usted no debería tener relaciones sexuales o debería tomar precauciones anticonceptivas adicionales no hormonales (por ejemplo, uso de preservativo u otro método de barrera). No utilice el método del ritmo o el de la temperatura. Estos métodos pueden no ser fiables cuando ya Coral. Esto no cambia mensualmente de la temperatura corporal y del movimiento cervical.

**Coral, al igual que otros anticonceptivos hormonales, no protege frente a la infección por VIH (SIDA) o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual.**

**Cuando no debe tomar Coral**  
No debe usar Coral si tiene alguna de las afecciones enumeradas a continuación. Informe a su médico si tiene alguna de las afecciones enumeradas a continuación. Su médico comentará con usted qué otra forma de anticoncepción sería más adecuada.

**No tome Coral si:**  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP), en los pulmones (embolia pulmonar, EP) o en otros órganos.  
• Si sabe que padece un trastorno que afecta a la coagulación de la sangre, por ejemplo, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina III, factor V Leiden o anticuerpos antifosfolípidos.  
• Si necesita una operación y si pasa mucho tiempo sin ponerse de pie.  
• Si ha sufrido alguna vez un ataque al corazón o un ictus.  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) un aneurisma de aorta (una afección que provoca un fuerte dolor en el pecho y puede ser el primer signo de un ataque al corazón) o un accidente isquémico transitorio (AIT, síntomas temporales de ictus).  
• Si tiene alguna de las siguientes enfermedades que pueden aumentar su riesgo de formación de un coágulo en las arterias:  
• Diabetes grave con lesión de los vasos sanguíneos.  
• Presión arterial muy alta.  
• Infección muy alta de grasas en la sangre (colesterol o triglicéridos).  
• Una afección llamada hiperhomocitemia.  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) un aneurisma llamado "migraña con aura".  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) una enfermedad del hígado y su función hepática no se ha normalizado todavía.  
• Si sus riñones no funcionan bien (insuficiencia renal).  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) un tumor en el hígado.  
• Si tiene (o ha tenido alguna vez) o sospecha que tiene cáncer de mama o de los órganos sexuales.  
• Si tiene hemorragias regulares de causa desconocida.  
• Si es alérgica (hipersensible) a etinilestradiol o drosipirenona o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Esto puede manifestarse con picazón, erupción o inflamación.  
• Si tiene hepatitis C, y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/patrasvir/rotonavir y dasabuvir.

**Advertencias y precauciones**  
¿Cuándo debe consultar a su médico?  
**Busque asistencia médica urgente**

• Si nota posibles signos de un coágulo de sangre que pueden significar que está sufriendo un coágulo de sangre en la pierna (es decir, trombosis venosa profunda), un coágulo de sangre en el pulmón (es decir, embolia pulmonar), un ataque al corazón o un ictus.  
Para obtener una descripción de los síntomas de estos efectos adversos graves, consulte "Cómo reconocer un coágulo de sangre".

**Informe a su médico si sufre cualquiera de las siguientes afecciones.**  
En algunas situaciones, informarle a su médico acerca de cualquier otra píldora combinada, y puede ser necesario que su médico le examine de forma periódica. Si la infección o la afección empeora mientras está usando Coral, también debe informar a su médico.

• Si algún familiar cercano tiene o ha tenido alguna vez cáncer de mama.  
• Si tiene alguna enfermedad del hígado o de la vesícula biliar.  
• Si tiene diabetes.  
• Si tiene depresión.  
• Si tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad intestinal inflamatoria crónica).  
• Si tiene lupus eritematoso sistémico (LES, una enfermedad que afecta a su sistema inmune de defensa).  
• Si tiene síndrome urémico hemolítico (SUH, un trastorno de la coagulación de la sangre que provoca insuficiencia en el riñón).  
• Si tiene anemia de células falciformes (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos).  
• Si tiene niveles elevados de grasas en la sangre (hipertriglicémidia) o antecedentes familiares concisos de esta afección. La hipertriglicémidia se ha asociado a un mayor riesgo de padecer pancreatitis (inflamación del páncreas).  
• Si necesita una operación o pasa mucho tiempo sin ponerse de pie.  
• Si acaba de dar a luz o tiene un mayor riesgo de sufrir coágulos de sangre. Debe preguntar a su médico cuándo puede empezar a tomar Coral tras el parto.  
• Si tiene una infección de las venas que hay debajo de la piel (tromboflebitis superficial).  
• Si tiene hipertensión.  
• Si tiene una enfermedad que apareció por primera vez durante el embarazo o durante un anterior uso de hormonas sexuales, por ejemplo, pérdida de audición, porfiria (una enfermedad de la sangre), herpes gestacional (erupción cutánea con el embarazo), cema de Sjögren (una enfermedad que afecta a las glándulas salivales y lagrimales).  
• Si tiene o ha tenido alguna vez cloasma (una decoloración de la piel, especialmente de la cara o el cuello conocido como "manchas del embarazo"). Si es así, evite la luz solar directa la la luz ultravioleta.  
• Si tiene angiodema hereditario, los productos que contienen estrógenos pueden inducir o empeorar los síntomas del angiodema. Debe consultar a su médico de inmediato si experimenta síntomas de angiodema tales como hinchazón de la cara, lengua o garganta y/o dificultad para tragar o articular, junto con dificultad para respirar.  
Consulte a su médico antes de empezar a tomar Coral.

**Información adicional sobre poblaciones especiales**  
Uso en niños

Coral no está diseñado para su uso en mujeres cuyos períodos aún no han comenzado.

**COÁGULOS DE SANGRE**  
El uso de un anticonceptivo hormonal combinado como Coral aumenta su riesgo de presentar un coágulo de sangre en comparación con no usarlo. En raras ocasiones un coágulo de sangre puede bloquear vasos sanguíneos y provocar problemas graves.

Se pueden formar coágulos de sangre.  
• En las venas (lo que se llama "trombosis venosa", "tromboembolismo venoso" o TEV).  
• En las arterias (lo que se llama "trombosis arterial", "tromboembolismo arterial" o TEA).  
La recuperación de los coágulos de sangre no es siempre completa. En raras ocasiones puede haber efectos graves duraderos o, muy raramente, pueden ser mortales.

**Es importante recordar que un coágulo de sangre perjudicial debido a Coral es posible.**

**CÓMO RECONOCER UN COÁGULO DE SANGRE**  
**Busque asistencia médica urgente si nota alguno de los siguientes signos o síntomas:**

Experimenta alguno de estos signos?	¿Qué es posible que está sufriendo?
<ul style="list-style-type: none"><li>Hinchazón de una pierna o la tibia de una vena de la pierna o pie, especialmente cuando va acompañada de:<ul style="list-style-type: none"><li>Dolor o sensibilidad en la pierna, que tal vez se advierte sólo al ponerse de pie o caminar.</li></ul></li><li>Aumento de la hinchazón en la pierna afectada.</li><li>Cambio de color de la piel de la pierna, p. ej. si se pone palida, roja o azul.</li></ul>	Trombosis venosa profunda.
<ul style="list-style-type: none"><li>Falta de aliento repentina sin causa conocida o respiración rápida.</li><li>Tos repentina sin una causa clara, que puede estar sin sangre.</li><li>Dolor agudo en el pecho que puede aumentar al respirar hondo.</li><li>Abrandamiento intenso o mareo.</li><li>Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación.</li><li>Dolor de cabeza repentino, intenso o prolongado sin causa conocida.</li><li>Dolor de estómago intenso.</li></ul>	Embolia pulmonar.
<p>Síntomas que se producen con más frecuencia en un ojo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pérdida inmediata de visión, o bien.</li><li>Visión borrosa repentina, que puede evolucionar hasta pérdida de la visión.</li></ul>	Trombosis de las venas retinianas (coágulo de sangre en el ojo).
<ul style="list-style-type: none"><li>Dolor, molestias, presión, pesadez en el pecho.</li><li>Sensación de opresión o plenitud en el pecho, brazo o debajo del estómago.</li><li>Sensación de plenitud, indigestión o ahogo.</li><li>Malestar de la parte superior del cuerpo que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo y el estómago.</li><li>Sudoración, náuseas, vómitos o mareo.</li><li>Dificultad extrema, ansiedad o falta de aliento.</li><li>Ladidos del corazón acelerados o irregulares.</li></ul>	Ataque al corazón.
<ul style="list-style-type: none"><li>Dificultad de entrombamiento repentino de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.</li><li>Confusión repentina, dificultad para hablar o para comprender.</li><li>Dificultad repentina de visión en un ojo o en ambos.</li><li>Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o de la coordinación.</li><li>Dolor de cabeza repentino, intenso o prolongado sin causa conocida.</li><li>Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones.</li></ul>	Ictus.
<p>A veces los síntomas de un ictus pueden ser breves, con una recuperación casi inmediata y completa, pero de todos modos debe buscar asistencia médica urgente ya que puede correr riesgo de sufrir otro ictus.</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad.</li><li>Dolor de estómago intenso (abdomen agudo).</li></ul>	Coágulos de sangre que bloquean otros vasos sanguíneos.

**COÁGULOS DE SANGRE EN UNA VENA**  
**¿Qué puede ocurrir si se forma un coágulo de sangre en una vena?**

El uso de anticonceptivos hormonales combinados se ha relacionado con un aumento del riesgo de coágulos de sangre en las venas (trombosis venosa). No obstante, estos efectos adversos son raros, se producen con más frecuencia en el primer año de uso de un anticonceptivo hormonal combinado.  
• Si se forma un coágulo de sangre en una vena de la pierna o del pie, puede provocar trombosis venosa profunda (TVP).  
• Si un coágulo de sangre se desliza desde la pierna y se aloja en el pulmón puede provocar una embolia pulmonar.  
En muy raras ocasiones se puede formar un coágulo en una vena de otro órgano como el ojo (trombosis de las venas retinianas).  
**¿Cuál es el mayor riesgo de presentar un coágulo de sangre en una vena?**  
El riesgo de presentar un coágulo de sangre en una vena es mayor en el primer año en el que se toma un anticonceptivo hormonal combinado por primera vez. El riesgo puede ser mayor también si vuelve a empezar a tomar un anticonceptivo hormonal combinado (el mismo medicamento o un medicamento diferente) después de una interrupción de 4 semanas o más. Después del primer año, el riesgo puede ser algo menor que si no estuviera tomando un anticonceptivo hormonal combinado. Cuando deja de tomar Coral, su riesgo de presentar un coágulo de sangre regresa a la normalidad en pocas semanas.  
**¿Cuál es el riesgo de presentar un coágulo de sangre?**  
El riesgo depende de su riesgo natural de TEV. El uso de anticonceptivo hormonal combinado que está tomando.  
El riesgo global de presentar un coágulo de sangre en la pierna o en el pulmón (TVP o EP) con Coral pesaño.  
• De cada 10.000 mujeres que no usan un anticonceptivo hormonal combinado y que no están embarazadas, unas 2 presentarán un coágulo de sangre en un año.  
• De cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene levonorgestrel o norgestimato, unas 5-7 presentarán un coágulo de sangre en un año.  
• De cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene drosipirenona como Coral, entre unas 9 y 12 mujeres presentarán un coágulo de sangre en un año.  
El riesgo de presentar un coágulo de sangre dependerá de sus antecedentes personales.

¿Experimenta alguno de estos signos?	Riesgo de presentar un coágulo de sangre en un año
Mujeres que <b>no</b> utilizan un contraceptivo hormonal combinado y que no están embarazadas.	Unas 2 de cada 10.000 mujeres.
Mujeres que utilizan un contraceptivo hormonal combinado que contiene <b>levonorgestrel, noretisterona o norgestimato</b> .	Unas 5-7 de cada 10.000 mujeres.
Mujeres que utilizan Coral.	Unas 9-12 de cada 10.000 mujeres.

**Factores que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre en una vena**  
El riesgo de tener un coágulo de sangre con Coral es pequeño, pero algunas afecciones aumentan el riesgo. Su riesgo es mayor:

• Si tiene exceso de peso (índice de masa corporal o IMC superior a 30 kg/m<sup>2</sup>).  
• Si tiene una de las siguientes condiciones que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre en una vena: una edad temprana (es decir, antes de los 50 años aproximadamente). En este caso podría tener un trastorno hereditario de la coagulación de la sangre.  
• Si necesita operación y si pasa mucho tiempo sin ponerse de pie debido a una lesión o enfermedad o si tiene la pierna inerte. Tal vez haya que interrumpir el uso de Coral varias semanas antes de la intervención quirúrgica o mientras tenga menos movilidad. Si necesita interrumpir el uso de Coral pregúntele a su médico cuándo puede empezar a usarlo de nuevo.  
• Al aumentar la edad (en especial por encima de unos 35 años).  
• Si ha dado a luz hace menos de unas semanas.  
El riesgo de presentar un coágulo de sangre aumenta cuantitativamente más afecciones tener.  
Los viajes en avión (más de 4 horas) pueden aumentar temporalmente el riesgo de un coágulo de sangre, en especial si tiene alguno de los demás factores de riesgo enumerados. Es importante informar a su médico si sufre cualquiera de las afecciones anteriores, aunque no está segura. Su médico puede decirle qué hay que interrumpir el uso de Coral.  
Si alguna de las afecciones anteriores cambia mientras está utilizando Coral, por ejemplo un pariente próximo experimenta una trombosis sin causa conocida o usted aumenta mucho de peso, informe a su médico.

**COÁGULOS DE SANGRE EN UNA ARTERIA**  
**¿Qué puede ocurrir si se forma un coágulo de sangre en una arteria?**

Al igual que un coágulo de sangre en una vena, un coágulo en una arteria puede provocar problemas graves. Por ejemplo, puede provocar un ataque al corazón o un ictus.  
**Factores que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre en una arteria**  
Es importante señalar que el riesgo de un ataque al corazón o un ictus al utilizar Coral es muy pequeño, pero puede aumentar.  
• Con la edad (por encima de unos 35 años).  
• Si fuma. Cuando utiliza un anticonceptivo hormonal combinado como Coral, lo que hace de fumar. Si no es capaz de dejar de fumar y tiene más de 35 años, su médico puede aconsejarle que utilice un tipo de anticonceptivo diferente.  
• Si tiene sobrepeso.  
• Si tiene presión alta.  
• Si alguna persona próxima ha sufrido un ataque al corazón o un ictus a una edad temprana (menos de unos 50 años). En este caso usted también podría tener mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus.  
• Si usted o alguna de sus parientes próximos tiene un nivel elevado de grasas en la sangre (colesterol o triglicéridos).  
• Si padece migrañas, especialmente migrañas con aura.  
• Si tiene un problema de corazón (trastorno de las válvulas, alteración del ritmo cardíaco llamado fibrilación auricular).  
• Si tiene diabetes.  
• Si tiene más de una de estas afecciones o si alguna de ellas es especialmente grave, el riesgo de presentar un coágulo de sangre puede verse incrementado aún más.  
Si alguna de las afecciones anteriores cambia mientras está utilizando Coral, por ejemplo empieza a fumar, un pariente próximo experimenta una trombosis sin causa conocida o usted aumenta mucho de peso, informe a su médico.

**Coral y cáncer**

El cáncer de cuello uterino se ha detectado más a menudo en mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados. Sin embargo, esto puede deberse a otras causas, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual.  
En las mujeres que usan anticonceptivos combinados se ha observado una tasa de cáncer de mama ligeramente superior, pero no se sabe si esto se debe al tratamiento. Por ejemplo, puede ser que se detecten más tumores en mujeres que toman anticonceptivos combinados porque son examinadas por el médico más a menudo. La incidencia de tumores de mama disminuye gradualmente después de dejar de tomar anticonceptivos hormonales combinados. Es importante reconocer que tumores de las mamas y debe acudir a su médico si notase cualquier bulto. En raras ocasiones se han comunicado tumores benignos en el hígado, y aún más raramente tumores malignos, en usuarias de anticonceptivos. Acuda a su médico si sufre un dolor abdominal inusualmente fuerte.  
**Trastornos psiquiátricos**  
Algunas mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales como Coral han notificado depresión o un estado de ánimo deprimido. La depresión puede ser grave y a veces puede interrumpir el tratamiento suicidas. Si experimenta alteraciones del estado de ánimo y síntomas depresivos, póngase en contacto con su médico para obtener asesoramiento médico adicional o posible.  
**Sangrado entre períodos**  
Durante los primeros meses en los que está tomando Coral, puede tener sangrados inesperados (sagrados fuera de los días de uso de los comprimidos placebo). Si estos sangrados persisten más allá de unos meses, o continúan tras unos meses, su médico debe investigar la causa.  
**Qué debe hacer si no tiene su regla durante los días de placebo**  
Si ha tomado correctamente todos los comprimidos activos de color amarillo, no ha tenido vómitos o diarrea intensa y tampoco ha tomado otros medicamentos, es muy improbable que esté embarazada. Si la regla prevista no le viene en dos ocasiones consecutivas, puede estar embarazada. Consulte con su médico inmediatamente. No comience con el siguiente blister hasta que no esté segura de que no está embarazada.

**CORAL COMP. REC. (SC24910)**

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO
SC24910	140x465 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	29/04/2021	29/04/2021	NEGRO	SIN PLEGAR

e.5044 | estudio gráfico creativo

**Embarazo y lactancia**  
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.  
**Embarazo:** Si está embarazada, no debe tomar este medicamento. Si se queda embarazada durante el tratamiento con Coral debe interrumpir el tratamiento inmediatamente y ponerse en contacto con su médico. Si desea quedarse embarazada, puede dejar de tomar Coral en cualquier momento.  
**Lactancia:** En general, no se recomienda tomar Coral durante el período de lactancia. Si quiere tomar un anticonceptivo mientras está en período de lactancia, debe consultar con su médico.

**Conducción y uso de máquinas**  
No hay información que sugiera que el uso de Coral tenga algún efecto sobre la capacidad para conducir o para utilizar máquinas.

**Información importante sobre algunos de los componentes de Coral**  
Coral contiene lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud. También considere cualquier medicamento que se le haya prescrito.  
También informe a cualquier otro médico o dentista que le recete otro medicamento de que toma Coral. Ellos pueden indicar si usted necesita tomar precauciones anticonceptivas adicionales (por ejemplo, preservativos) y, si es así, durante cuánto tiempo.  
Algunos medicamentos pueden tener influencia en los niveles de sangre de Coral. Esto puede ser un efecto anticonceptivo, o pueden causar sangrados inesperados. Esto puede ocurrir con medicamentos utilizados en el tratamiento de:  
• la epilepsia (p.ej. primidona, fenitoina, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, febamato).  
• la tuberculosis (p.ej. rifamicina).  
• las infecciones por VIH y el virus de la hepatitis C (inhibidores de la proteasa e inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa tales como ritonavir, nevirapina, efavirenz).  
• las infecciones por hongos (p.ej. griseofulvina, itraconazol).  
• artritis, artritis (glicocorticoides).  
• hipertensión arterial pulmonar (bosentan).  
No los preparados a base de hebra de San Juan.  
Coral puede influir sobre el efecto de otros medicamentos, por ejemplo:  
• los medicamentos que contienen ciclosporina.  
• el antiepiléptico lamotrigina (puede llevar a un aumento de la frecuencia de convulsiones).  
• heparina (utilizado para tratar problemas renales).  
• itramidina (utilizado para tratar el dolor muscular y/o calambres musculares).

No tome Coral si usted tiene hepatitis C, y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/patrasvir/rotonavir y dasabuvir, se pueden producir aumentos en los resultados de pruebas hepáticas (aumentando la enzima hepática ALT).  
Su médico le prescribirá otro tipo de anticonceptivo antes de comenzar el tratamiento con estos medicamentos. Coral se puede volver a 2 semanas después de la finalización de este tratamiento.

**Pruebas de laboratorio**

Si usted necesita un análisis de sangre u otros análisis de laboratorio, informe a su médico o al personal del laboratorio que está tomando la píldora, ya que los anticonceptivos orales pueden influir en los resultados de algunas pruebas.  
**Toma de Coral con los alimentos y bebidas**  
Coral puede tomarse con o sin alimentos, y con algo de agua si fuera necesario.

**Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Coral puede producir efectos adversos, aunque no todos las personas los sufran. Si sufre cualquier efecto adverso, especialmente si es grave y persistente, o si nota algún cambio de salud que cree que puede deberse a Coral, consulte a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
**Frecuentes:**  
• náuseas en la menstruación, sangrado entre períodos, dolor en las mamas, sensibilidad en las mamas, secreción vaginal blanquecina e infección vaginal por hongos.  
• dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo.  
• migraña.  
• rubor.  
• molestias.  
**Poco frecuentes:**  
• Aumento del tamaño de las mamas, cambios en la libido (interés en el sexo).  
• Prurido (surgimiento de picazón), presión sanguínea baja.  
• vómitos, diarrea.  
• acné, picazón, erupción cutánea, pérdida de pelo (alopecia).  
• infección vaginal.  
• relación de los vasos y cambios en el peso corporal.  
• problemas auditivos.  
• reacciones alérgicas (hipersensibilidad), asma.  
• problemas cardíacos.  
• enfermedades de la piel, eritema nudoso (una enfermedad de la piel caracterizada por la formación de nódulos rojos dolorosos) o eritema multiforme (caracterizado por la aparición de un sarpullido o erupción cutánea con rojeces con forma de diana o dianas).  
• secreción mamaria.  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.

**Cómo tomar Coral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.  
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.  
Cada blister contiene 21 comprimidos activos de color amarillo y 7 comprimidos blancos de placebo. Los comprimidos de Coral de distintos colores están ordenados. Un blister contiene 28 comprimidos.  
No tome un comprimido de Coral todos los días, con algo de agua si fuera necesario. Puede tomar los comprimidos con o sin comida, pero debe tomar los comprimidos todos los días aproximadamente a la misma hora.  
**Contraindicaciones:**  
• coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo: en una pierna o pie (es decir, TVP);  
• en un pulmón (es decir, EP);  
• en un ataque al corazón.  
• ictus.  
• ictericia o síntomas similares al ictericia a lo de un ictus, lo que se llama ictericia isquémico transitorio (AIT).  
• coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo.  
Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo.