

# Perifar

## 800

Spefar

Ibuprofeno 800 mg  
Vía oral  
Cápsulas blandas

### Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Conservar este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico. Debe consultar a su médico si la fiebre no mejora después de 3 días o el dolor ocasional empeora o si no mejora después de 5 días.

### Fórmula

Cada cápsula blanda de **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** contiene: Ibuprofeno: 800 mg; Excipientes: c.s

### ¿Qué es PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS y para qué se utiliza?

**PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** contiene ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), actúa reduciendo el dolor y la fiebre.

**PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** está indicado para el tratamiento de la fiebre, el tratamiento del dolor de intensidad leve o moderado incluido la migraña, el tratamiento de la artritis, la artritis reumatoide juvenil, artrosis, espondilitis anquilosante, inflamación no reumática y la dismenorrea primaria.

### No tome este medicamento si:

- es alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo.
- ha presentado reacciones alérgicas de tipo asmático al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos.
- padece o ha padecido asma, rinitis o urticaria.
- padece una enfermedad grave del hígado, del riñón o del corazón.
- padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea.
- vomita sangre, presenta heces negras o diarreas con sangre.
- se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

### Tenga precaución:

- Si tiene edemas (retención de líquidos).
- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene presión arterial alta.
- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio.
- Ibuprofeno puede enmascarar la fiebre, que es un signo importante de infección, dificultando su diagnóstico.
- Si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es posible que su médico deba efectuar controles de forma regular.
- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej, diarrea grave o vómitos, tome abundante líquido y contacte inmediatamente con su médico, ya que el ibuprofeno en este caso podría provocar una insuficiencia renal.
- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta. Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los pacientes de edad avanzada.
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle al médico la utilización de otros medicamentos como los corticoides y los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulceroosa.
- Si está en tratamiento con diuréticos.
- Si padece lupus eritematoso sistémico ya que puede producirse meningitis aséptica.
- Si padece porfiria intermitente aguda.
- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más elevadas del medicamento.
- Es posible que se produzcan reacciones alérgicas con este medicamento.

SC24970 - 25/01/21

- El médico efectuará un control más estricto si recibe ibuprofeno tras ser sometido a cirugía mayor.

- Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela.

Es importante que utilice la dosis más pequeña que controle el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

### Precauciones cardiovasculares.

Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas. No supere la dosis recomendada ni la duración del tratamiento.

Debe comentar su tratamiento con su médico antes de tomar **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** si:

- Tiene problemas de corazón incluida una insuficiencia cardíaca, angina (dolor torácico) o si ha sufrido un ataque al corazón, cirugía de bypass, arteriografía periférica o cualquier tipo de ictus (incluido un "mini-ictus" o accidente isquémico transitorio "AIT").

- Tiene la presión arterial alta, diabetes, el colesterol alto, tiene antecedentes familiares de enfermedad de corazón o ictus, o si es fumador.

Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o hipertensión arterial.

### Reacciones cutáneas.

Se han notificado reacciones cutáneas graves asociadas al tratamiento con ibuprofeno. Deje de tomar **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** y acuda a su médico inmediatamente si presenta cualquier erupción cutánea, lesiones en las membranas mucosas, ampollas u otros signos de alergia, ya que estos pueden ser los primeros signos de una reacción cutánea grave.

### Interferencias con pruebas de diagnóstico.

Si le van a hacer alguna prueba de diagnóstico (incluidos los análisis de sangre, orina, etc.), comunique al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados de dichas pruebas.

### Embarazo, lactancia y mujeres en edad fértil

#### EMBARAZO

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Debe evitarse el uso de ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre del embarazo. Si se considera esencial, el médico le prescribirá la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible. No deberá utilizarse en el último trimestre de embarazo.

#### LACTANCIA

Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

#### FERTILIDAD

El ibuprofeno pertenece a un grupo de medicamentos que pueden disminuir la fertilidad de la mujer. Este efecto es reversible cuando se deja de tomar el medicamento.

#### Uso en niños

No administrar este medicamento a menores de 14 años.

#### Uso en mayores de 65 años

Las personas de edad avanzada suelen ser más propensas a sus efectos, por lo que a veces debe reducir la dosis. Consulte a su médico.

#### Conducción y uso de máquinas

Aunque no son de esperar efectos en este sentido, debe utilizarse con precaución si nota somnolencia o mareos.

#### Información importante sobre algunos componentes de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS

**PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** contiene potasio y sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Los pacientes con insuficiencia renal o con indicación de dieta pobre en potasio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 96 mg de potasio por cápsula blanda.

#### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

**PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** puede afectar o ser afectado por otros medicamentos. En particular si está utilizando algunos de los siguientes medicamentos puede ser necesario modificar la dosis de alguno de ellos o interrumpir el tratamiento:

- Otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina.
- Antiagregantes plaquetarios como ticlopidina.
- Medicamentos anticoagulantes (p. ej, ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina).
- Litio.
- Metotrexato.
- Mifepristona.

### PERIFAR 200 CÁPSULAS BLANDAS (SC24918)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO
SC24970	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	25/01/2021	--/------	PANTONE 4625 C	SIN PLEGAR

- Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos.
- Hidantoínas como fenitoína.
- Sulfamidas como el sulfametoxazol y el cotrimoxazol.
- Anticóidicos como la cortisona y la prednisona.
- Diuréticos.
- Pentoxifilina.
- Probenecid.
- Antibióticos del grupo de las quinolonas como el norfloxacino.
- Sulfonpirazona.
- Sulfonilureas como la tolbutamida.
- Tacrolimus o ciclosporina.
- Zidovudina.
- Medicamentos que bajan la presión arterial alta (inhibidores de la ECA como captopril, betabloqueantes como los medicamentos con atenolol y antagonistas de los receptores de angiotensina II como losartán).
- Trombolíticos.
- Antibióticos aminoglucósidos como la neomicina.
- Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba.

#### Interferencia con pruebas analíticas

- La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes pruebas de laboratorio:
- Tiempo de hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de suspender el tratamiento).
  - Concentración de glucosa en sangre (puede disminuir).
  - Aclareamiento de creatinina (puede disminuir).
  - Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir).
  - Concentraciones en sangre de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de creatinina y potasio (pueden aumentar).
  - Incremento de valores de transaminasas.
- Informe a su médico si va a someterse a un análisis clínico y si está tomando o ha tomado recientemente ibuprofeno.

#### Toma de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS con los alimentos, bebidas y alcohol.

Tomar este medicamento con las comidas o con leche.

No debe administrarse ibuprofeno con alcohol para evitar dañar el estómago. La utilización de ibuprofeno en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas - cerveza, vino, licor... al día) puede provocar hemorragia de estómago.

#### Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** puede producir efectos no deseados. Los efectos adversos son más comunes en personas mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.

Frecuentes: cansancio, dolor de cabeza, trastornos del estómago e intestino (ardor de estómago, diarrea, náuseas, vómitos), trastornos de la piel (erupciones cutáneas, picazón) y zumbidos de oídos.

Poco frecuentes: reacciones alérgicas, asma, rinitis y urticaria, hemorragias y úlceras gastrointestinales, alteraciones del sueño y ligera inquietud, visión borrosa, disminución de la agudeza visual o cambios en la percepción del color) y alteraciones auditivas.

Raros: edema, alteraciones sanguíneas (leucopenia), perforación de estómago e intestino, alteraciones del hígado (incluyendo ictericia), alteraciones del riñón consistente en: nefritis aguda intersticial con hematuria (sangre en orina), proteinuria (eliminación de proteínas por la orina) y ocasionalmente síndrome nefrótico; depresión, oscurecimiento de la visión, rigidez de cuello y broncoespasmos, disnea (dificultad para respirar) y angioedema.

Muy raros: se pueden producir: meningitis aséptica, alteraciones de la sangre (anemia aplásica y anemia hemolítica) y de la coagulación, hipertensión e insuficiencia cardíaca, alteraciones graves de la piel, ojos y mucosas como el síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme grave) y la necrosis epidérmica tóxica (lesiones en la piel y mucosas que provocan el desprendimiento de la piel) y el eritema multiforme.

Frecuencia no conocida: Se puede producir una reacción cutánea grave conocida como síndrome DRESS. Los síntomas incluyen erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y eosinófilos elevados (un tipo de glóbulos blancos). Erupción generalizada roja escamosa, con bultos debajo de la piel y ampollas localizados principalmente en los pliegues cutáneos, el tronco y las extremidades superiores, que se acompaña de fiebre al inicio del tratamiento (neutrofilos eosinofílica generalizada aguda). Deje de tomar **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** si presenta estos síntomas y solicite atención médica de inmediato.

#### Cómo tomar PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS

Siga exactamente las instrucciones de administración de ibuprofeno indicadas por su médico.

Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se obtendrán los resultados esperados. Del mismo modo tampoco emplee ibuprofeno más tiempo del indicado por su médico.

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Este medicamento se administra por vía oral. Los pacientes con molestias de estómago deben tomar el medicamento con leche y/o durante las comidas.

Esperar al menos 4-6 horas entre dosis consecutivas. Si los síntomas empeoran, si la fiebre persiste durante más de 3 días o el dolor ocasional más de 5 días, debe consultar al médico.

**Adultos y adolescentes a partir de 14 años.** Como dosis media de orientación se sugiere: 1200 - 1800 mg de ibuprofeno al día, según criterio médico. En algunos casos pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2400 mg en adultos y de 1600 mg en adolescentes de 14 a 18 años.

#### Niños:

En procesos dolorosos de intensidad leve a moderada y cuadros febriles, la dosis diaria recomendada es de 800 - 1600 mg, administrados en varias dosis.

En la **dismenorrea primaria**, se recomienda dosis de 400 mg de ibuprofeno hasta una dosis máxima diaria de 1.200 mg.

En caso de deshidratación crónica, esta debe ajustarse a la dosis mínima de mantenimiento que proporcione el control adecuado de los síntomas.

En la **artritis reumatoide**, pueden requerirse dosis superiores pero, en cualquier caso, se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 2.400 mg de ibuprofeno.

En procesos inflamatorios la dosis diaria recomendada es de 1.200 - 1.800 mg de ibuprofeno, administrados en varias dosis. La dosis de mantenimiento suele ser de 800 - 1.200 mg. La dosis máxima diaria no debe exceder de 2.400 mg.

**Niños y adolescentes menores de 14 años.** No administrar este medicamento a menores de 14 años sin consultar al médico.

No se recomienda el uso de **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** en niños y adolescentes menores de 14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología recomendada en este grupo de pacientes.

En artritis reumatoide juvenil, se pueden dar hasta 40mg/kg de peso corporal por día en dosis divididas.

**Pacientes con enfermedad renal y/o hepática:** es posible que el médico le recete una dosis más baja de lo habitual. Si es así, tome la dosis exacta que este le haya prescrito.

#### Si toma más PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS de lo que debiera

Si ha tomado más **PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS** de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del envase, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

La mayoría de los casos de sobredosis han sido asintomáticos. Existe un riesgo de sintomatología con dosis mayores de 80 - 100 mg/kg de ibuprofeno.

La aparición de los síntomas se produce habitualmente en un plazo de 4 horas.

Los síntomas pueden incluir náuseas, dolor de estómago, vómitos (que pueden contener sangre), dolor de cabeza, zumbido de oídos, confusión y movimiento involuntario de los ojos. A dosis elevadas se han notificado síntomas de somnolencia, dolor en el pecho, palpitaciones, pérdida de conciencia, convulsiones (principalmente en niños), debilidad y mareo, sangre en la orina, escalofríos y problemas para respirar.

No existe ningún antídoto específico. Se ha de considerar la administración oral de carbón activado si el paciente se presenta durante la primera hora después de la ingestión de una cantidad potencialmente tóxica.

#### Presentación de PERIFAR 800 CÁPSULAS BLANDAS

Envases conteniendo 1, 5, 10 y 30 cápsulas blandas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de deterioro.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local de su comercialización.

#### Producto medicinal.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30°C

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.

En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722

Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a [www.cimlatam.com](http://www.cimlatam.com) o escríbanos a [contacto@cimlatam.com](mailto:contacto@cimlatam.com) y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Spefar S.A. Av. Milán 3907 - Montevideo.

Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:  
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

SC24970 - 25/01/21

## PERIFAR 200 CÁPSULAS BLANDAS (SC24918)

CÓDIGO	MEDIDAS ABIERTO	SOPORTE	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA APROBACIÓN	TINTA	PLEGADO
SC24970	103 x 138 mm	Mayor a 60 g/m <sup>2</sup>	25/01/2021	--/------	PANTONE 4625 C	SIN PLEGAR