

Ultraferol D3 100.000 UI

Spefar

Vitamina D3 100.000 UI Emulsión Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.

Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula

Cada 10 mL contiene: Vitamina D3 100 000 U.I.; Excipientes: Propilenglicol 4,12 g, Sacarina sódica 2 mg, Ciclamato de sodio 4 mg, Metilparabeno, Propilparabeno; otros c.s.

¿Qué es Ultraferol D3 100.000 UI y para qué se utiliza?

Ultraferol D3 100.000 UI emulsión oral contiene colecalciferol (vitamina D3). La vitamina D3 puede encontrarse en determinados alimentos, además de producir la piel en presencia de luz solar. La vitamina D3 ayuda a los riñones y al intestino a absorber el calcio y contribuye al desarrollo de los huesos. La falta de vitamina D3 es la causa principal del raquitismo (una mineralización defectuosa de los huesos en niños) y de la osteomalacia (una mineralización inadecuada de los huesos en adultos).

Ultraferol D3 100.000 UI se usa para: Tratar la deficiencia de vitamina D3 en adultos y adolescentes (niños de ≥ 12 años)

No tome este medicamento si:

- es alérgico a la vitamina D3 o a alguno de los demás componentes de este medicamento,
- tiene niveles elevados de calcio en la sangre (hipercalcemia) o en la orina (hipercalciuria),
- tiene piedras en los riñones (cálculos renales),
- tiene niveles elevados de vitamina D3 en la sangre (hipervitaminosis D).

Tenga precaución si:

- está tomando determinados medicamentos usados para tratar los trastornos cardíacos (p. ej., glucósidos

- cardíacos, como la digoxina)
- padece sarcoidosis (un trastorno del sistema inmunitario que puede provocar un aumento de los niveles de vitamina D en el organismo)
- está tomando otros medicamentos que contengan vitamina D, o si toma alimentos o leche enriquecidos con vitamina D
- es probable que tenga una exposición elevada a la luz solar mientras toma este medicamento
- toma suplementos adicionales que contienen calcio, ya que podría desarrollar piedras en el riñón. Su médico controlará los niveles sanguíneos de calcio para asegurarse de que no son demasiado elevados mientras toma **Ultraferol D3 100.000 UI**.
- está tomando de forma simultánea aportes complementarios de calcio o fosfato, dado que existe un aumento del riesgo de presentar niveles de calcio elevados en sangre (hipercalcemia)
- tiene problemas de riñón o alguna enfermedad renal. Es posible que su médico quiera medir sus niveles de calcio en sangre o en orina.

Su médico deberá controlar su nivel de calcio en la sangre mediante pruebas analíticas si toma una dosis equivalente a una dosis diaria de vitamina D3 superior a 1.000 UI durante un periodo de tiempo prolongado.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.

Ultraferol D3 100.000 UI no está recomendado durante el embarazo o la lactancia debido a la dosis elevada de vitamina D.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito que la vitamina D3 tenga efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

- Medicamentos que actúan en el corazón o en los riñones, como glucósidos cardíacos (p. ej., digoxina) o diuréticos (p. ej., bendroflumetazida). Cuando se toman al mismo tiempo que la vitamina D3, estos medicamentos pueden provocar un aumento sustancial del nivel de calcio en la sangre y la orina.
- Medicamentos que contienen vitamina D o si toma alimentos ricos en vitamina D, como algunos tipos de leche enriquecida con vitamina D.
- Actinomicina y antifúngicos imidazólicos (p. ej., clotrimazol y ketoconazol). Estos medicamentos pueden afectar a la forma en la que su organismo procesa la vitamina D3.
- Los siguientes medicamentos, dado que pueden interferir en el efecto o la absorción de la vitamina D3: medicamentos antiepilépticos (anticonvulsivos),

SC23093-19/08/21

SC23093 Ultraferol D3 100.000 UI

Spefar

CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
SC23093	95x130	19/08/21	19/08/21	Mayor a 60 g/m ²	130 mm en 5
654 C					

e.5044 | estudio gráfico creativo

barbitúricos; o glucocorticoides (hormonas esteroideas como la hidrocortisona o la prednisona). Estos medicamentos pueden reducir el efecto de la vitamina D3

- medicamentos que reduzcan el nivel de colesterol en la sangre (como la colestiramina o el colestipol)
- determinados medicamentos para la pérdida de peso que reducen la cantidad de grasa que absorbe el organismo (p. ej., orlistat)
- determinados laxantes (como la parafina líquida)

Toma de Ultraferol D3 100.000 UI con los alimentos y bebidas

Preferiblemente, debe tomar este medicamento con una comida abundante para ayudar a su organismo a absorber la vitamina D3. También puede mezclar la solución con alimentos fríos o templados para ayudarle a tomar este medicamento.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Ultraferol D3 100.000 UI** puede producir efectos no deseados.

Deje de tomar **Ultraferol D3 100.000 UI** y busque asistencia médica inmediatamente si experimenta síntomas de reacción alérgica grave, como:

- hinchazón en la cara, los labios, la lengua o la garganta
- dificultad para tragar
- urticaria y dificultad para respirar

Los posibles efectos adversos pueden incluir:

Poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas): Demasiado calcio en la sangre (hipercalcemia); demasiado calcio en la orina (hipercalciuria)

Raros (afectan a menos de 1 de cada 1000 personas): Erupción en la piel; picazón; Urticaria

Cómo tomar Ultraferol D3 100.000 UI

Siga exactamente las instrucciones de administración de **Ultraferol D3 100.000 UI** indicadas por su médico. Su médico deberá definir la dosis necesaria en su caso. Para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D, se ajustará la dosis en función del nivel de vitamina D en su sangre (niveles de 25(OH)D).

Preferiblemente, debe tomar **Ultraferol D3 100.000 UI** con una comida abundante.

Este medicamento tiene sabor a limón/curazao. **Ultraferol D3 100.000 UI** puede tomarse solo o también puede mezclar la solución con una pequeña cantidad de alimentos fríos o templados inmediatamente antes de tomarlo (una pequeña cantidad de comida, yogur, leche, queso u otros productos lácteos). No guarde ningún producto o mezcla de comida que contenga **Ultraferol D3 100.000 UI** para utilizarlo más tarde o en la siguiente comida. Asegúrese de tomar la dosis completa.

Uso en adultos y adolescentes (niños ≥ 12 años de edad)
Para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D

sintomática, la dosis recomendada es de 100.000 UI en una única toma al mes.

Uso en niños

El uso de este medicamento en niños sólo es recomendable cuando el cumplimiento diario supone un problema.

Uso en pacientes con insuficiencia renal

Ultraferol D3 100.000 UI no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal grave, dado que la vitamina D en forma de colecalciferol no se metaboliza de forma normal y deben usarse otras formas de vitamina D.

Uso en pacientes con insuficiencia hepática

No se requiere un ajuste de la dosis.

Uso en pacientes de edad avanzada

Deberá realizarse un control especial de los niveles de calcio en suero y orina y de la función renal en los pacientes de edad avanzada. Consulte con su médico.

Si olvidó tomar Ultraferol D3 100.000 UI

Es importante tomar **Ultraferol D3 100.000 UI** como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si toma más Ultraferol D3 100.000 UI del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Los síntomas más frecuentes de una sobredosis son: náuseas, vómitos, sed excesiva, producción de grandes cantidades de orina durante 24 horas, estreñimiento y deshidratación, así como niveles elevados de calcio en la sangre y la orina (hipercalcemia e hipercalciuria) observados en las pruebas analíticas.

Presentación de Ultraferol D3 100.000 UI

Frasco conteniendo 10 ml de emulsión sabor limón/curazao.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimatam.com o escribanos a contacto@ciamatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30° C.

Spfar S.A. Av Millán 3907 - Montevideo
Industria Uruguaya

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

SC23093-19/08/21

SC23093 Ultraferol D3 100.000 UI



CÓDIGO	FORMATO	ACTUALIZACIÓN	APROBACIÓN	SOPORTE	PLEGADO
SC23093	95x130	19/08/21	19/08/21	Mayor a 60 g/m ²	130 mm en 5
654 C					

e.5044 | estudio gráfico creativo